

# Mustang™ Forte

## UKRUDTSMIDDEL

**ADVARSEL: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).** Farlig ved indtagelse (H302). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Undgå indånding af spray (P261). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270). Bær beskyttelseshandsker (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. *Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.* **Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 32. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Førstehjælp:** Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.

™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



0288604

2411

**NETTOINDHOLD: 5 LITER**



# Mustang™ Forte

**UKRUDTSMIDDEL**

UFI: 0D05-C0Q3-000J-Y141

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.  
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og  
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.**

Ukrudtsmiddel nr. 64-70

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Aminopyralid 10 g/L (0,94% w/w). (formuleret som  
aminopyralid-K-salt 11,83 g/l (1,12 % w/w)). Florasulam 5 g/l (0,47 %  
w/w). 2,4-D 180 g/l (16,98 % w/w). (formuleret som 2,4-D-ethylhexyl  
271,49 g/l (25,61 % w/w)). Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT).  
6 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut  
inhalationstoksicitet.

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.

**Batch nr. og produktionsdato:** Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, 1411 København K  
Tlf. 45 28 08 00, [www.corteva.dk](http://www.corteva.dk)**

™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



**NETTOINDHOLD: 5 LITER**

**Blank area for in-house print of  
2D data matrix code**



### **Teknisk information**

Mustang Forte er et systemisk ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinter- og vårsæd om foråret.

Mustang Forte bekæmper bl.a. burre-snerre, kamille, snerle-pileurt, valmue, kornblomst, hvidmelet gåsefod, fuglegræs, korsblomstret ukrudt og agertidse.

Mustang Forte må kun anvendes en gang i samme afgrøde.

Mustang Forte må ikke anvendes, hvor der er udlagt blandinger indeholdende kløver, lucerne eller andre bælgplanter, samt i korn til helsæd.

### **Virkemåde**

Mustang Forte indeholder ALS-hæmmeren florasulam og auxindannerne aminopyralid og 2,4-D

Mustang Forte optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter vil der, alt efter ukrudtsart, ses begyndende symptomer fra få dage til få uger efter behandling. Den fulde effekt ses fra 3-4 uger efter behandling

### **Klimaforhold ved anvendelse**

Optimal temperatur for anvendelse er mellem 5-20° C.

Undgå sprøjtninger under meget tørre og varme forhold eller forud for frost.

Undgå at behandle når afgrøden er under stress fra kulde, tørke, står i vandlidende jord, angrebet af skadedyr, lider af mangel på næringsstoffer etc.

**Non-printed area on page 2 ONLY  
(on the back of 2D code area printed  
on the front page)**

## Doserings- og anvendelsesvejledning

Afgrøde	BBCH	Dosering, l/ha	Ukrudtsarter og forventet effekt	
			85-100%	70-84%
Vårbyg Vårhvede Havre	13-20	0.3	Raps, hyrdetaske, kornblomst, hvidmelet gåsefod, storkenæb, kamille, mark forglemmigej, snerle-pileurt, fersken-pileurt, ager-sennep og fuglegræs	Læge-jordrøg, burresnerre, rød tvetand, ager-stedmoderblomst og skærm-vortemælk
			Som ovenfor samt: pengeurt	Gul okseøje, agertidse, skærm-vortemælk, burresnerre, vej-pileurt og pengeurt
Vinterhvede Rug Triticale Vinterbyg	21-32	0.5	Som ovenfor samt: Gul okseøje, burresnerre, ager-svinemælk og vej-pileurt	Agertidse, skærm-vortemælk, hanekro og pengeurt
			Som ovenfor samt: Gul okseøje, burresnerre, ager-svinemælk og vej-pileurt	Hanekro
Vinterhvede Rug Triticale Vinterbyg	23-29	0.5	Hyrdetaske, kornblomst, hvidmelet gåsefod, burresnerre, lugtløs kamille, fuglegræs og mark forglemmigej	Hanekro
			Som ovenfor samt: valmue og pengeurt	Hanekro
Vinterhvede Rug Triticale Vinterbyg	30-32	1.0	Som ovenfor samt: raps, kornriderspore, hanekro og ager-sennep	Agertidse

Maksimalt én behandling per afgrøde per vækstsæson. Den maksimalt tilladte dosering bestemmes af afgrøde og tidspunkt for behandling.

### **Additiv**

Det er normalt ikke nødvendigt at tilsætte additiv til Mustang Forte.

### **Jordtyper**

Mustang Forte kan den anvendes på alle jordtyper.

### **Regnfasthed**

Mustang Forte er regnfast efter 1 time

### **Tankblandinger**

Mustang Forte kan ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-p-ethyl eller clodinafop.

### **Omsåning**

Ved omsåning kan der kun etableres korn, græs eller majs. Forud for genetablering bør eventuelle planterester indarbejdes i jorden ved kraftig harvning eller pløjning.

### **Efterfølgende afgrøde**

Fra det følgende efterår kan der etableres korn, raps, græs og majs. Da Mustang Forte indeholder aminopyralid, skal der gå 14-24 mdr. mellem Mustang Forte behandlingen og etablering af følgende følsomme afgrøder:

**14 mdr.:** Kartoffler og andre natskyggearter, sukkerroer, løg, guleroed og andre skærmpanter.

**24 mdr.:** Ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter, agurk, salat og andre kurvblomstrede.

### **Plantemateriale og efterfølgende afgrøde**

Halm og staldgødning/dybstrøelse indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte, må ikke anvendes:

- I drivhuse, til kompost eller produktion af champignon
- Til tildækning af bredbladede afgrøder.
- I biogasanlæg

Efter anvendelse af 0.5 l/ha Mustang Forte eller mindre, anbefales det at indarbejde halm samt staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte,

senest 4 mdr. før etablering af andre afgrøder end korn, raps, græs og majs.

Efter anvendelse af mere end 0.5 l/ha Mustang Forte gælder følgende retningslinier (for halmhåndtering):

- Halm må kun bortføres fra ejendommen til industriel brug eller afbrænding.
- Halm eller staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) som indeholder halm fra afgrøder behandlet med Mustang Forte:
  - Kan indarbejdes i jorden når som helst før etablering af korn, raps, græs og majs
  - Skal indarbejdes i jorden min. 7 mdr før etablering af andre afgrøder.

### **Personlige værnemidler**

I henhold til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg foreslås følgende:

**Ved opblanding:** Anvend overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.

**Ved udsprøjtning:** Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes særlige værnemidler.

Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

### **Sprøjteteknik og vandmængde**

Mustang Forte skal udbringes med en marksprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Udstyret skal indeholde præparatfyldestyret eller udstyr til direkte injektion.

Anbefalet vandmængde er 100-300 l/ha. Anvend en sprøjteteknik som er tilpasset ukrudtets størrelse og bladstilling. Ved behandling i kraftige afgrøder og hvor der er behov for god nedtrængning, anbefales minimum 200 liter vand pr. hektar.

For at undgå risiko for afdrift, bør der ved behandling langs markskel og marker med følsomme afgrøder være særlig opmærksomhed på sprøjteteknik og vindforhold.

## Eksempel på sprøjteteknik

Vand (l/ha)	Dyse	Tryk (bar)	Hastighed
100	Grøn – ISO 015 (lavdrift)	2,5	6,6 km/t
150	Gul – ISO 020 (lavdrift)	2,5	5,8 km/t
200	Lilla – ISO 025 (Lavdrift/fladsprede)	2,5	5,5 km/t

### Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

**Præparatfyldeudstyr:** Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og Mustang Forte fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Mustang Forte i fyldestationen.

**Direkte injektion:** Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.

### Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave

**Bemærk!** Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Vær meget opmærksom på at få rengjort alle indvendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser.

- Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal.
- Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange.
- Fyld vand i tanken - 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear<sup>1</sup> Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst

15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel.

- Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

### Udvendig rengøring af sprøjteudstyr

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

### Resistensstrategi

Produktnavn	Type	Aktivstof	HRAC gruppe	Risiko for udvikling af resistens
MUSTANG FORTE	HERBICID	Florasulam	B	Høj
		Aminopyralid 2,4-D	O	Lav

Corteva Agriscience anbefaler en stærk anti-resistens strategi. Corteva Agriscience anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Corteva Agriscience at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

### Lagring

Opbevares tørt og frostfrit.

### Tom emballage

Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

### **Producentansvar**

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Corteva Agriscience Denmark A/S er medlem af Dansk Planteværn.

<sup>1</sup> Varemærke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
INTENTIONALLY BLANK**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
INTENTIONALLY BLANK**

# Mustang<sup>TM</sup> Forte

## UKRUDTSMIDDEL

UFI: 0D05-C0Q3-000J-Y141

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.  
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og  
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.**

Ukrudtsmiddel nr. 64-70

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse:** Aminopyralid 10 g/L (0,94% w/w). (formuleret som aminopyralid-K-salt 11,83 g/l (1,12 % w/w)). Florasulam 5 g/l (0,47 % w/w). 2,4-D 180 g/l (16,98 % w/w). (formuleret som 2,4-D-ethylhexyl 271,49 g/l (25,61 % w/w)). Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). 6 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.

**Batch nr. og produktionsdato:** Se pakningen.

Holdbar minimum 2 år fra produktionsdato.

**Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, 1411 København K  
Tlf. 45 28 08 00, [www.corteva.dk](http://www.corteva.dk)**

<sup>TM</sup> Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



**NETTOINDHOLD: 5 LITER**



**NO PRINT – GLUE PAGE**