

Mustang™
HERBITSIID

Kasutusvaldkond. Kaheiduleheliste umbrohtude tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer).

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

Florasulaam 6,25 g/l; 2,4-D 300 g/l

Preparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0217/04.01.07

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Pakendid: 1 L, 2 L, 5 L, 20 L

Registreerimise haldaja, tootja ja pakendaja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhaageni K,
Taani. Tel: +45 45 28 08 00

Corteva Agriscience Denmark A/S consultant Eestis:

Tel. +372 5855 7473, www.corteva.ee



Hoiatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H302 Allaneelamisel kahjulik. H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. SP 1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

TOOTE OHUTUSINFORMATSIOON

Ettevaatusabinõud

Vältida taimekaitsevahendi sattumist nahale ja silma ning pritsimisudu sissehingamist. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist.

Esmaabi

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte! Pöörduda arsti poole.

Nahaga kokkupuutel: Võtta seljast määrdunud riided. Pesta nahapinda seebi ja rohke veega.

Silma sattumisel: Loputada kiiresti rohke veega 15 minutit (silmalaud avatud). Järelkontroll silmaarsti juures.

Suhu sattumisel: Loputada kohe suud ja juua palju vett. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti pole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Mitte esile kutsuda oksendamist!

HÄDAABI TELEFON 112

Keskkonnaohtlikkus

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Taara purunemisel

Mahaläinud vedel preparaat katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Juhul, kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohutustada, tuleb saastunud ala eraldada ja mullale sattunud aine eemaldada. Saastunud pinnasekiht tuleb töödelda absorbeeriva ainega, maha koorida, koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Kasutamiseõpetus

Toimeviis

Mustang on süsteemne herbitsiid, mis koosneb kahest toimeainest: florasulaam ja 2,4-D, mis omastatakse taime lehtede kaudu.

Florasulaam peatab taimede aminohapete sünteesi ja 2,4-D toimib kasvuhormoonide pidurdajana, mille tagajärjel ei saa taimerakud enam jaguneda.

Ilmastikutingimused pritsimise ajal

Mustang'it kasutatakse tärganud umbrohtude tõrjeks kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, kui temperatuur on + 5 C. Teravilju võib pritsida 2 lehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 12-32). Pritsitavad umbrohud ei tohiks olla suuremad kui 2-4 lehte.

Doseerimine ja pritsimise ajastamine

Kultuurid	Kulunorm	Tõrjespekter
Tõrje suvi- ja taliteraviljadel (v.a. kaer)	0,4-0,6 l/ha	Väga hea tõrjeefekt: rukkilill, valge hanemalts, piimohakas, harilik hiirekõrv, põldohakas, virn e. roomav madar, vesihein, magun, harilik kirburohi, konnatatar, valge karikakar, põld-litterhein, kesalill, põld-lõosilm, põldrõigas, põldsinep, raps võõrkultuurina. Keskmine tõrjeefekt: põldkannike, verev iminõges, võilill, põldosi, kare kõrvik, piimalill. Rahuldav tõrjeefekt: harilik punand.

Muld

Herbitsiidi Mustang võib kasutada eri tüüpi pinnasel.

Vihmakindlus

Mustang'i vihmakindlus normaaltingimustes on 1 tund.

Pritsimisvõtted

Herbitsiidi Mustang saab kasutada traktori külge kinnitatud taimekaitsepritsiga. Seda saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu.

Soovitav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsimistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaatide kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täitmiseseadme kasutamine: Kasutades Mustang'it, täitke täitmiseseadme paak poolenisti veega, seejärel lisage soovitud kogus preparaati. Segu imeda pritsipaaki, ning samal ajal lisada paaki ülejäänud kogus puhast vett. Seejärel loputage täiteseade ning tühjad anumad, kui neid on. Korrake alumise ventiili avamise ja sulgemise protseduuri seni, kuni täiteseadmes ei ole silmaga nähtavaid jälgi Mustang'ist.

Vahetu sisseimemine: Kui te kasutate vahetu sisseimemise seadet, juhtige lahjendamata toode otse torudesse, mis lähevad pritsipaagist pihustiteni. Kui lülitate seadme välja või lõpetate pritsimise, tuleb läbi viia süsteemi läbipesu ja puhastamine. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

Paagi puhastamine

Sõltumata täiteseadest pritsitakse pritsimislahuse jäägid ja loputusvesi eelnevalt töödeldud alale. Loputusvee paagi maht peab olema piisav, et lahjendada pritsimislahuse jääke vähemalt 50 korda. Kui kasutate sisemisi pihusteid, peske pritsipaak koheselt pärast kasutamist puhtaks loputusveepaagist pärineva veega. Soovitatav on jagada loputusvesi erinevate loputuste vahel ning korrata paagi pesu ja pihustamist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sõites eelnevalt töödeldud alale.

Pritsi väline puhastamine

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal põllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud põllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et oleks olemas olemas oleks vajalik kogus vett.

Paagisegud

Mustang'it võib segada selliste fungitsiididega nagu Falcon¹ Forte, Juventus² 90, Tilt³ 250 EC, Artea⁴ 330 EC, Allegro² Super, Folicur¹, Corbel⁴, Tango² Super; insektitsiidiga Fastac² 50, Decis¹ Mega, kasvuregulatoriga CCC⁵ ja leheväetistega nagu X-leheväetis ja Super leheväetis.

Ettevaatusabinõud

Mustang'it ei tohi kasutada liblikõieliste allakülvide korral.

Järgnevad kultuurid

Järgneval aastal võib samal põllul kasvatada kõiki kultuure.

Ümberkülv

Kui Mustang'iga pritsitud kultuur on mingil põhjusel hävinud, võib asenduskultuurina samale põllule külvata teravilju, maisi ja kõrrelisi heintaimi.

Hoiutingimused

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otsese päikese kiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödadest.

Taara kahjutustamine

Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega, koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.. Taara korduvkasutamine on keelatud. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Mahavalgunud preparaat koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tähelepanu!

Kõik meie poolt tarnitavad tooted on kõrge kvaliteediga ning me oleme kindlad nende sobivuses, kuid kuna meil puudub kontroll nende säilitamise, käsitsemise, segamise või kasutamise üle ning enne või pärast pihustamist või selle ajal valitsevate ilmastikutingimuste üle, ei rakendu neile seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimused või tagatised, mis puudutavad meie toodete rahuldavat kvaliteeti, sobivust eesmärgiks. Toote säilitamisest, käsitsemisest, rakendamisest või kasutamisest tingitud ebatulemuslikkus, kahju või vigastus ei kuulu ei meie ega edasimüüjate vastutusalasse. Meie töötajad ega agendid ei ole volitatud neid tingimusi muutma, sõltumata sellest, kas nad on nende toodete kasutamise järelvaatamise või abistamise kaudu seotud.

®™ Ettevõtte The Corteva Chemical Company („Corteva”) või Corteva sidusettevõtja kaubamärk

¹ Bayer Crop Science

² BASF

³ Adama

⁴ Syngenta Agro Service Ag

⁵ Nufarm