

# POTARGO®

## ERBICIDA PER VARIETA' DI RISO TOLLERANTI AGLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

Meccanismo d'azione: Gruppo B (HRAC)

### POTARGO®

#### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono  
IMAZAMOX, puro g 3,04 (= 33,3 g/l)  
Coformulanti q. b. a g 100  
Contiene: Ossirano, metil-, polimero con ossirano,  
mono-C10-16-alchil etere, fosfato.

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea. H332: Nocivo se inalato. H361d: Sospettato di nuocere al feto. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso**

#### CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260: Non respirare la nebbia o i vapori. P264: Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/ il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P332+P313: In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362+P364: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenitore/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1**

#### Distribuito da:

**Corteva Agriscienze Italia s.r.l. - Via dei Comizi Agrari, 10, 26100  
Cremona. Tel. +39 0372 709900**

#### Officina di produzione:

BASF Agri-production S.A.S - Gravelines (France)  
TORRE s.r.l. - Torrenieri (SI)

#### Officina di ri-etichettatura:

ITAFERT SRL- Canale (CN) - Italia  
C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche - Cimadolmo (TV) - Italia

#### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 19823 del 07.03.2025

Contenuto netto: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

© Marchio Registrato

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza di 5 metri; in alternativa impiegare ugelli che riducono la deriva di almeno 75%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**INFORMAZIONI MEDICHE:** In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### MECCANISMO D'AZIONE

POTARGO è un erbicida contenente imazamox che deve essere applicato in post-emergenza. Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge 3-6 settimane dopo l'applicazione. POTARGO svolge al meglio la sua attività erbicida quando è impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

#### SPETTRO D'AZIONE

Le malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Digitaria* spp. (digitarie), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera* spp. (eterantere), *Leptochloa* spp. (leptocloa), *Oryza* spp. (riso crodo), *Panicum dichotomiflorum* (panico delle risaie), *Polygonum lapathifolium* (poligono nodoso) e *Scirpus* spp. (lische).

Le malerbe della risaia moderatamente sensibili sono: *Ammania coccinea* (ammaia arrossata), *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Echinochloa oryzoides* (giavone maggiore), *Cyperus* spp. (zigoli), *Leersia oryzoides* (leersia)

L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi), come le solfoniluree, le triazolpirimidine e gli imidazolinoni.

#### DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

**RISO, varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni:** per la lotta al riso crodo e ad altre infestanti. POTARGO diluito in un volume d'acqua di 200-300 l/ha, deve essere impiegato come sotto riportato; tenendo presente di tarare il trattamento sullo stadio delle infestanti meno sensibili (giavone bianco entro la 4 foglia) indipendentemente dallo stadio della coltura.

**Riso seminato in acqua** - Eseguire il primo trattamento con 1,1 l/ha di POTARGO su terreno saturo d'acqua e con coltura allo stadio di 1-4 foglie. Risommergere la risaia 3-4 giorni dopo il trattamento. Ripetere il trattamento con la stessa dose su terreno saturo d'acqua e con riso allo stadio compreso tra metà e fine accestimento (circa 2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni.

**Riso seminato in asciutta** - Eseguire il primo trattamento con 1,1 l/ha di POTARGO, con coltura allo stadio di 1-3 foglie ed eseguire dopo 3-4 giorni una bagnatura/sommersione. Ripetere il trattamento su risaia sgrondata con 1,1 l/ha di POTARGO con riso allo stadio di metà accestimento e risommergere la risaia dopo 3-4 giorni dal secondo intervento.

POTARGO può essere miscelato con il coadiuvante DASH HC alla concentrazione 0,25-0,5% (0,25-0,5 litri ogni 100 litri d'acqua) in presenza delle infestanti meno sensibili, in particolare *Echinochloa oryzoides*, od elevate infestazioni.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:** il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione, oltre a mettere in atto tutte le pratiche agricole (rotazioni culturali adeguate, falsa semina abbinata a tecniche di diserbo, appropriate lavorazioni del suolo) limitanti lo sviluppo delle resistenze. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti.

**Avvertenza** - Nei 10 giorni seguenti al trattamento, non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare al massimo l'efficacia della tecnologia che si basa sulla tolleranza delle varietà di riso agli erbicidi imidazolinoni, si raccomanda di seguire le linee guida definite.

In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico di riferimento.

#### FITOTOSSICITA'

Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbanò colture in condizioni di forte stress (per es. per siccità o caldo eccessivo).

Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata e radicchio.

Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

In caso di colture solanacee adiacenti ai campi di riso trattati con POTARGO, è necessario rispettare una fascia tampone di 5 metri impiegando ugelli con una riduzione della deriva pari al 75%; in alternativa, è possibile anche usare ugelli con una riduzione della deriva pari al 90% rispettando nel contempo una fascia tampone di 1 metro.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 07.03.2025