StarterMn Platinum

NUTRItional TECHNOLOGY

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI: [PFC 1(C)(I)(b)(i)]
CONCIME MINERALE N (SO_3) 5 (11,5) CON MICROELEMENTI IN SOLUZIONE

TITOLO DICHIARATO:

5,0 % p/p ..... Azoto (N) totale
5,0 % p/p ..... Azoto (N) sotto forma ureica
11,5 % p/p ..... anidride solforica (SO_3) idrosolubile
0,3 % p/p ..... Boro (B) idrosolubile
0,3 % p/p ..... Rame (Cu) solfato, idrosolubile
5,0 % p/p ..... Manganese (Mn) solfato, idrosolubile
0,05 % p/p ..... Molibdeno (Mo) sodio, idrosolubile
3,0 % p/p ..... Zinco (Zn) solfato, idrosolubile

ELENCO DEGLI INGREDIENTI:

Solfato di manganese[1] (CAS: 10034-96-5), Urea[1] (CAS: 57-13-6), Solfato di zinco[1] (CAS: 7446-19-7).
[1]Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

ISTRUZIONI D'USO:

StarterMn Platinum è un concime liquido costituito da un complesso di micronutrienti che apporta manganese, boro, rame, molibdeno, zinco, azoto e zolfo. **StarterMn Platinum** promuove l'equilibrio nutrizionale per ottenere una maggiore produttività e redditività delle colture. La **Tecnologia Stoller** presente nella sua formulazione ne consente la miscelazione con altre Soluzioni Stoller e garantisce un rapido assorbimento e traslocazione per un migliore utilizzo dei nutrienti.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Coltura						Momento di applicazione	
Colture arabili	Grano, triticale, orzo, segale, avena, sorgo...	✓	0,65 %	300-500	2-3	Da inizio accestimento a fine levata	1-2 applicazioni ogni 15-30 giorni
	Mais, Girasole	✓				Durante lo sviluppo vegetativo	
Oleaginose e legumi	Soia, colza, pisello, fagiolo	✓				Dalle 4 foglie fino a quando i baccelli hanno raggiunto la dimensione finale	
Ortaggi da frutto, da tubero		✓	0,30 %	700-1000		Da 4 foglie a inizio fioritura	
Ortaggi da foglia, da bulbo, ortaggi da radice		✓				Da 4 foglie fino a inizio fioritura	2-3applicazioni ogni 15 giorni
Pascoli, erba medica		✓	0,65 %	300-500			
Frutteti	Pomacee e drupacee, tropicale	✓	0,20 %	1000-1500		Dal germogliamento all'allegagione	2-3 applicazioni ogni 7-15 giorni
	Frutta secca, melograno		0,10 %	2000-2500			
Vivai		✓	0,30 %	700-1000			
Agrumi		✓	0,08 %	2500-3000			
Olivo		✓	0,10 %	2000-2500			
Vite	Uva da tavola	✓	0,30 %	700-1000			
	Uva da vino		0,40 %	500-700			
Piccoli frutti		✓					
Fragola		✓	0,30 %	700-1000		Dalle 4 foglie a inizio fioritura	

Applicazione fogliare · Fertirrigazione · Concia del seme · Trattamento alla semina
Dose ottimale · Dosi min - mass (L/ha) · Volume trattamento (L) · Vol. tratt. (L) min - mass · Frequenza

Contattare un tecnico specializzato Corteva Agriscience Italia per raccomandazioni più specifiche.

Osservazione:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei concimi liquidi. Tuttavia, se si vuole mischiare con altri prodotti, è necessario consultare il tuo distributore o rappresentante locale. Sarà responsabilità dell'utilizzatore aumentarli o diminuirli in base alle caratteristiche della coltura, sempre con la consulenza di un Tecnico specializzato. Si consiglia sempre di fare una piccola prova prima di usare il prodotto.

CONDIZIONI DI MAGAZZINAGGIO RACCOMANDATE:
Immagazzinare i recipienti tra 0 e 35 °C. Condizioni generali per lo stoccaggio: evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Attenersi anche alle informazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza dei materiali (MSDS).

INFORMAZIONI SU SICUREZZA E AMBIENTE:
Leggere attentamente le istruzioni sull'etichetta prima di utilizzare il prodotto. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo concime. La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).



PERICOLO

Solfato di manganese · (H_2O) (CAS: 10034-96-5)
Zinco solfato monoidrato (CAS: 7446-19-7)
Rame(II) solfato pentaidrato (CAS: 7758-99-8)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **H318:** Provoca gravi lesioni oculari. **H373:** Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **CONSIGLI DI PRUDENZA: P260:** Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P273:** Non disperdere nell'ambiente. **P280:** Indossare guanti protettivi/protezione del viso/indumenti protettivi/protezione respiratoria/calzature protettive. **P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310:** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P501:** Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori.

Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.

UFI: 3360-U09X-P00P-S5UK
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti: contattare: 0039 0372 709900/709999 (O.U.).

ALTRE INFORMAZIONI/INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
Uso professionale.

Avvertenze:
Stoller Europe S.L.U. dà tutte le indicazioni in base all'esperienza. Possono presentarsi molti fattori incontrollabili (preparazione della miscela, clima, tipi di applicazione, ecc.). Per questa ragione, l'utilizzatore sarà responsabile per ogni danno che possa derivarne.

Fabbricante:
STOLLER EUROPE, S.L.U.
A Stoller Group Company
Elche Parque Empresarial
C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (Spagna)
(+34) 965 110 522
info@stollereurope.com
www.stollereurope.com

Flacone	Tappo
Plastica	Plastica
HDPE2	PP

CE

FORMA FISICA:	Liquido in soluzione
PESO NETTO:	6,7 kg ℮
VOLUME NETTO:	5 L ℮
NUMERO DI LOTTO:	