

Conspicuo®

FUNGICIDA

PIÙ DI QUANTO IMMAGINI




Due molecole ad azione sinergica su un gran numero di patologie delle drupacee

Caratteristiche

Nuova soluzione fungicida nata per offrire **flessibilità e ampio spettro d'azione** su un numero molto elevato di colture e patogeni. Le **due sostanze attive al suo interno**, *boscalid* e *pyraclostrobin*, appartengono a gruppi chimici distinti e posseggono un diverso meccanismo d'azione.

Questo assicura una buona strategia di prevenzione delle resistenze, anche in quelle colture caratterizzate da un numero limitato di interventi fungicidi.




BOSCALID

Modo d'azione: SDHI – Inibisce l'enzima della succinato deidrogenasi a livello del mitocondrio.

Spettro d'azione: *botrite, sclerotinia, moniliosi, oidio, Stemphillum...*

Mobilità: Sistemica/citotropica.



PYRACLOSTROBIN

Modo d'azione: Qoi – Inibisce l'enzima citocromo III a livello della cresta mitocondriale interna.

Spettro d'azione: *oidio, moniliosi, oomiceti, ruggini, alternaria...*

Mobilità: Loco-sistemica/translaminare.

Strategie 2025 - Drupacee

Fioritura

Conspicuo 1,5 Kg/Ha
oppure
Fontelis 1,2 L/Ha

Allegagione/Accrescimento frutto

Conspicuo 1,5 Kg/Ha
oppure
Fontelis 1,5 L/Ha

Maturazione

Conspicuo 1,5 Kg/Ha
oppure
Fontelis 1,5 L/Ha



Monilia

Monilia

Oidio



Elementi di etichetta

COMPOSIZIONE	Boscalid 26.7% + Pyraclostrobin 6%
FORMULAZIONE	Granulare - WG, granuli idrodispersibili
NUMERO DI REGISTRAZIONE	Autorizzazione del Ministero della Salute N. 18560 del 05.12.2024
GRUPPO FRAC	7,11 FUNGICIDI
CLASSIFICAZIONE	 ATTENZIONE
DOSE	1,0 - 1,8 Kg/Ha
N° MAX TRATT. ANNI	1 - 2 a seconda della coltura
MECCANISMO D'AZIONE	SDHI + Qoi
CONFEZIONE	1 Kg



Titolare della registrazione SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.