

Conspicuo[®]

FUNGICIDA

PIÙ DI QUANTO IMMAGINI




Due molecole ad azione sinergica su un gran numero di patologie delle colture orticole e arboree

Caratteristiche

Nuova soluzione fungicida nata per offrire **flessibilità e ampio spettro d'azione** su un numero molto elevato di colture e patogeni. Le **due sostanze attive che lo compongono**, *boscalid* e *pyraclostrobin*, appartengono a gruppi chimici distinti e posseggono un diverso meccanismo d'azione.

Questo assicura una buona prevenzione delle resistenze, anche in quelle colture caratterizzate da un numero limitato di interventi fungicidi.




BOSCALID

Modo d'azione: SDHI – Inibisce l'enzima della succinato deidrogenasi a livello del mitocondrio.

Spettro d'azione: *botrite, sclerotinia, moniliosi, oidio, Stemphillum...*

Mobilità: Sistemica/citotropica.






PYRACLOSTROBIN

Modo d'azione: QoI – Inibisce l'enzima citocromo III a livello della cresta mitocondriale interna.


Spettro d'azione: *oidio, moniliosi, oomiceti, ruggini, alternaria...*

Mobilità: Loco-sistemica/translaminare.

Strategie 2025 - Pomodoro/Solanacee

<p>Post trapianto</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Conspicuo 1,5 – 1,8 Kg/Ha</p> </div> 	<p>Fioritura/Allegagione</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Conspicuo 1,5 – 1,8 Kg/Ha oppure Fontelis 2,0 L/Ha</p> </div> 	<p>Maturazione bacche</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Fontelis 2,0 L/Ha</p> </div> 
<p>Botrite</p> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p>Oidio</p> <hr style="border: 1px solid blue;"/> <p>Cladosporiosi</p> <hr style="border: 1px solid green;"/> <p style="text-align: right;">Alternaria</p> <hr style="border: 1px solid orange;"/>		

Strategie 2025 - Lattuga

<p>Post trapianto</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Conspicuo 1,5 Kg/Ha</p> </div> 	<p>Sviluppo cespo</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Conspicuo 1,5 Kg/Ha oppure Fontelis 1,5 L/Ha</p> </div> 	<p>Sviluppo cespo</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Conspicuo 1,5 Kg/Ha oppure Fontelis 1,5 L/Ha</p> </div> 	<p>Ciclo Corto (30-40 gg) Prima applicazione 7-10 giorni dopo il trapianto , seguita da una seconda applicazione dopo 8-10 giorni.</p> <p>Ciclo lungo (>40 gg) Proseguire i trattamenti ad intervalli 8-10 giorni dopo la seconda applicazioni.</p>
<p>Botrite</p> <hr style="border: 1px solid red;"/> <p>Sclerotinia</p> <hr style="border: 1px solid cyan;"/>			

Elementi di etichetta

COMPOSIZIONE	Boscalid 26.7% + Pyraclostrobin 6%
FORMULAZIONE	Granulare - WG, granuli idrodispersibili
NUMERO DI REGISTRAZIONE	Autorizzazione del Ministero della Salute N. 18560 del 05.12.2024
GRUPPO FRAC	7,11 FUNGICIDI
CLASSIFICAZIONE	 ATTENZIONE
DOSE	1,0 – 1,8 Kg/Ha
N° MAX TRATT. ANNUI	1 - 2 a seconda della coltura
MECCANISMO D'AZIONE	SDHI + Qoi
CONFEZIONE	1 Kg



Titolare della registrazione SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.