La qualità non è un gioco.

Scegli la certezza a ogni trattamento.

Laser® 120 SC

Qalcova™ active

INSETTICIDA

Quando in gioco c'è il risultato del tuo raccolto un prodotto non vale l'altro. La formulazione di LASER® non lascia niente al caso: ti dà prestazioni costanti, risultati concreti e controllo nel tempo. Nato da un processo di fermentazione affinato da oltre 30 anni di ricerca ed esperienza, LASER® è l'insetticida di origine naturale con tecnologia Qalcova™ active progettato per garantirti prestazioni sempre affidabili, applicazione dopo applicazione.

Scopri di più su **corteva.it**

LASER®. Qualità inimitabile.

CORTEVA™ agriscience

Visita il sito corteva.it

TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2026 - Corteva

Qalcova™ active.
Niente è come lui.

Solo la ricerca avanzata e un processo produttivo esclusivo capace di garantire elevata purezza ed eccezionali performance tecniche, potevano generare il **nuovo Laser® 120 SC**, rendendo ancora più efficace la soluzione insetticida top di gamma di Corteva™ Agriscience, da anni fra i migliori standard di riferimento del mercato.

Bio e Difesa Integrata al top.

Il **nuovo Laser® 120 SC** è unico nel suo genere perché associa i benefici dei prodotti naturali a quelli di sintesi. **È autorizzato in agricoltura biologia e, per le sue performance, viene utilizzato regolarmente come soluzione centrale nelle principali strategie di difesa integrata.**

Sostanza attiva	**Qalcova™ active** (Spinosad puro) g. 11,6 (120 g/L)
Registrazione	16425 del 28/09/2015 del Ministero della Salute
Gruppo IRAC	5
Formulazione	Sospensione concentrata
Confezione	250 ml - 1 L - 3 L

La sua forza? Batteri efficaci per natura.

Il **nuovo Laser® 120 SC** contiene il principio attivo **Qalcova™ active**, frutto della moltiplicazione e della fermentazione di *Saccharopolyspora spinosa*, un batterio actinomicete naturalmente presente nel terreno, che attraverso un processo di Corteva™ Agriscience produce le **spinosine A e D che costituiscono il cuore pulsante di Qalcova™ active**.

UNICO

- Tecnologia Corteva.
- Nasce da batteri naturali.
- Forte e certificato bio.
- Meccanismo d'azione unico.

INDISPENSABILE

- Riferimento tecnico nel contenimento di diversi insetti, tra cui lepidotteri e tripidi.
- Registrato anche su colture tipiche del nostro territorio e su parassiti secondari.

ALL'AVANGUARDIA

- Profilo eco-tossicologico e ambientale favorevole.
- Rispettoso nei confronti degli insetti utili.
- Non crea acaro insorgenza.
- Soddisfa le esigenze della GDO.

CORTEVA™ agriscience



Attiva la gestione delle resistenze.

Agisce principalmente per ingestione oltre che per contatto. Trasloca per via citotropica e translaminare, dalla superficie trattata al mesofillo. Dopo 2 ore dal trattamento non è più dilavabile. Il suo **meccanismo d'azione, unico nel suo genere, ne fa il prodotto cardine per tutte le strategie di difesa**. Effettuare fino a 3 trattamenti di spinosine (Qalcova™ active e Jemvelva™ active) con un massimo di 2 trattamenti consecutivi.

L'agronomo consiglia.

- Applicazioni serali e nelle ore più fresche della giornata favoriscono l'azione del **nuovo Laser® 120 SC**.
- Il **nuovo Laser® 120 SC** presenta una buona miscibilità con i principali agrofarmaci.
- È importante effettuare una completa bagnatura della vegetazione.
- In caso di acque basiche, acidifcare.
- Bagnanti e oli possono incrementare l'efficacia del **nuovo Laser® 120 SC**.

Laser® 120 SC: colture registrate in orticoltura.

Il **nuovo Laser® 120 SC** è la soluzione indispensabile per il controllo, sia in pieno campo che in serra, dei principali insetti nocivi tra cui tripidi, lepidotteri inclusa la *Tuta absoluta* e minatori fogliari.

COLTURE	Principali parassiti controllati	Dosi	N° max trattamenti annui	Int di sicurezza
Pomodoro, melanzana in pieno campo ed in serra	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*	80 ml/hl (dose minima 800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
	Minatori fogliari *(Liriomyza trifolii)* in serra	200-300 ml/hl aseconda del livello di infestazione (1600-3600 ml/ha, con una dose massima di 3600 ml/ha)		
	Piralide del mais *(Ostrinia nubilalis)*	60-80 ml/hl aseconda del livello di infestazione (480-960 ml/ha)		
	Nottua mediterranea *(Spodoptera littoralis)* e nottua gialla del pomodoro *(Heliothis armigera)*	80-100 ml/hl utilizzando il dosaggio più elevato per larve di maggiori dimensioni (640-1200 ml/ha)		
	Fillominatrice del pomodoro *(Tuta absoluta)*	80-100 ml/hl a seconda del livello di infestazione (640-1200 ml/ha)		

COLTURE	Principali parassiti controllati	Dosi	N° max trattamenti annui	Int di sicurezza
Peperone in pieno campo ed in serra	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*	80 ml/hl (dose minima 800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
	Piralide del mais *(Ostrinia nubilalis)*	60-80 ml/hl aseconda del livello di infestazione (480-960 ml/ha)		
	Fillominatrice del pomodoro *(Tuta absoluta)*	80-100 ml/hl a seconda del livello di infestazione (640-1200 ml/ha)		
	Nottua mediterranea *(Spodoptera littoralis)* e nottua gialla del pomodoro *(Heliothis armigera)*	80-100 ml/hl a seconda del livello di infestazione (640-1200 ml/ha)		
Melone, cetriolo, zucca, zucchino, anguria in pieno campo ed in serra	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*	80 ml/hl (dose minima 800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
	Minatrice americana della gerbera *(Liriomyza trifolii)* in serra	200-300 ml/ha a seconda del livello di infestazione (1,2-3,0 L/ha con una dose massima di 3 L/ha)		
	Piralide del mais (*Ostrinia nubilalis*)	60-80 ml/hl a seconda del livello di infestazione (360-800 ml/ha		
	Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*) e nottua gialla del pomodoro (*Heliothis armigera*)	80-100 ml/hl utilizzando il dosaggio più elevato per larve di maggiori dimensioni (480-1000 ml/ha)		
Spinacio, bieta da foglie e da coste in pieno campo **baby-leaf** in pieno campo e in serra	Nottua mediterranea *(Spodoptera littoralis)* e nottua gialla del pomodoro *(Heliothis armigera)*	80-100 ml/hl utilizzando il dosaggio più elevato per larve di maggiori dimensioni (dose massima di 800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*, tripide degli orti *(Thrips tabaci)*, tripide delle palme (*Thrips palmi*)	100 ml/hl (dose massima di 800 ml/ha)		
Mais in pieno campo	Piralide *(Ostrinia nubilalis)*	800 ml/ha pari a 140-200 ml/hl	1 trattamento	90 giorni
Mais dolce in pieno campo	Piralide *(Ostrinia nubilalis)*	800 ml/ha pari a 140-200 ml/hl	2 trattamenti	3 giorni
Fagiolo, fagiolino, pisello, taccola *(pisello mangiatutto)* in pieno campo	Piralide del mais *(Ostrinia Nubilalis)*	800 ml/ha (100-140 ml/hl, a seconda del livello di infestazione)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	7 giorni
	Nottua del cavolo *(Mamestra brassicae)*			3 giorni per pisello
Patata in pieno campo	Dorifora della patata *(Leptinotarsa decemlineata)*, tignola della patata *(Phthorimaea operculella)*	200 ml/ha (40 ml/hl)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	7 giorni
Lattughe in pieno campo	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*	100 ml/hl (800 ml/ha, a seconda del livello di infestazione e del volume d'acqua)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni
	Nottua mediterranea *(Spodoptera littoralis)* e nottua gialla del pomodoro *(Heliothis armigera)*	80-100 ml/hl (800 ml/ha, a seconda del livello di infestazione)		

COLTURE	Principali parassiti controllati	Dosi	N° max trattamenti annui	Int di sicurezza
Baby leaf ed Erbe fresche *(valerianella, crescione, rosmarino, basilico, erba cipollina, maggiorana, melissa, menta, origano, prezzemolo, salvia, timo, santoreggia, ruta, pimpinella, ortica, issopo, dragoncello, cerfoglio, acetosa, nasturzio)* in pieno campo e in serra; **rucola** in serra	Tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*	100 ml/hl (800 ml/ha, a seconda del livello di infestazione e del volume d'acqua)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni 7 giorni per prezzemolo
	Nottua mediterranea *(Spodoptera littoralis)* e nottua gialla del pomodoro *(Heliothis armigera)*	80-100 ml/hl (800 ml/ha, a seconda del livello di infestazione)		
	Minatrice americana della gerbera *(Liriomyza trifolii)*	200-300 ml/hl (800-1800 ml/ha con una dose massima di 1800 ml/ha)		
Cipolla in pieno campo; **aglio e scalogno** in pieno campo e in serra	Tripide degli orti (*Thrips tabaci*) e tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), nottue (*Agrotis spp.*) e il cosside dell'aglio (*Dispessa ulula*)	80-100 ml/hl (800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	7 giorni
Porro, carciofo, finocchio, sedano, in pieno campo	Tripide degli orti (*Thrips tabaci*), tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*), nottua del cavolo, nottua mediterranea, nottue in generale, depressaria dei capolini del carciofo (*Gortyna xanthenes, Spodoptera spp, Agrotis spp., Depressaria erinaceella*)			7 giorni 3 giorni porro e carciofo
	Mosca del porro *(Napomyza gymnostoma)*	80 ml/hl		
Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza: cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di Bruxelles, cavolo verza in pieno campo e in serra	Tripide degli orti *(Thrips tabaci)* e tripide occidentale *(Frankliniella occidentalis)*, nottue dei cavoli *(Mamestra spp.)*, cavolaia *(Pieris spp.)*, rapaiola *(Pieris rapae)*, nottua mediterranea *(Spodoptera spp.)*, tignola delle crucifere *(Plutella xylostella)*, nottue in generale *(Agrotis spp.)*	80-100 ml/hl (800 ml/ha)	3 trattamenti e comunque non più di 2 consecutivi	3 giorni

Prodotto registrato anche su arboree, vite, estensive, floreali, ornamentali e tappeti erbosi.
Per maggiori approfondimenti rifarsi all'etichetta ministeriale.

Visita il sito corteva.it

TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2026 - Corteva

Vedi? Questo è l'innovativo effetto active.

Niente è come lui.

Il **nuovo Laser® 120 SC** di Corteva™ è leader nel controllo degli insetti. Una soluzione altamente specializzata, all'avanguardia della tecnologia, basata sul principio attivo Qalcova™ active, capace di proteggere il tuo raccolto. È frutto della collaborazione minuziosa tra i formulatori di Corteva™ ed i tecnici del territorio che da anni lavorano in sinergia a supporto degli agricoltori.

- Massimi standard qualitativi
- Dose ettaro ottimizzata
- Soluzione certificata e riconoscibile

Visita il sito corteva.it

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE..
LEGGERE ATTENTAMENTELE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore

TM, ®, Marchi commerciali di Corteva Agriscience e delle sue società affiliate. © 2026 - Corteva