CORTEVA™
agriscience

AZ™ 500

HERBICIDE

GROUP 29 HERBICIDE

HERBICIDE TEGEN DICOTYLEN TOE TE PASSEN IN VOOROPKOMST OF VROEGE NA-OPKOMST IN DIVERSE GEWASSEN

Toelatingsnummer : 15264N (W3)

Aard van het preparaat: Suspensieconcentraat
Werkzame stof: Isoxaben
Gehalte: 500 g/L

Toelatingshouder :
Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB BERGEN OP ZOOM - Nederland
Tel : 0164 444 000 • Website: www.corteva.nl

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

STORL 1 PET

1 L e

3 362130 164678 >

UFI: TKC1-D01D-S00H-5YQ8

GHS09

WAARSCHUWING

GEVARENAANDUIDINGEN

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280c Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

Lotnummer : zie op de fles
Professioneel gebruik

0292605

2502

Copy

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Wintergraan m.u.v. winterrogge en kanariezaad	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15-0,20 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcylcus	0,2 L/ha per teeltcylcus	-
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04-0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcylcus	0,2 L/ha per teeltcylcus	6
Cichorei	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04-0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcylcus	0,2 L/ha per teeltcylcus	6
Voedergrasland	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-
Appel (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook[1]	0,3 L/ha [2]	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-
Peer (onbedekte teelt)	Stroken-behandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook[1]	0,3 L/ha [2]	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-
Uien (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-

Copy

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Sjalotten (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-
Prei (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teeltcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-
Grasvegetatie	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

[1] Bespuiting alleen op de (zwart)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per “behandeld oppervlak” ((zwart)strook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een percentage is van het totale perceel.

[2] Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

Het gebruik in de teelt van zwenkgras, beemdgras, vezelgewassen, vlinderbloemige groenbemesters, rogge, Japanse haver, facelia, spurrie, afrikaantjes, raketblad, sudangras, deder, bladraap, zwaardherik, niger, klaver, meekrap, miscanthus, olifantsgras, Russische paardenbloem, graszodenteelt, kweepeer, mispel, steenvruchten, knoflook, asperge, rabarber, zaaiprei, lelie, bloemisterijgewassen, coniferen en kerstbomen, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de onbedekte teelt van haver, raaigras m.u.v. Engels raaigras, Timothee, Kropaar, Struisgras, Kamgras, Ruwe smele, Fakkelgras, Festulolium, oliehoudende zaden, klein fruit, noten, boon zonder peul, erwt zonder peul, courgette, augurk, pompoen, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, aardpeer, Japanse aardappel, zoete aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel, yam, bosui, aromatische kruidgewassen, aromatische wortelgewassen, medicinale kruidgewassen, medicinale wortelgewassen, vruchten of bessen (kruidenteelt), bloembol- en bloemknolgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt en veredelingsteelt en basiszaadproductie is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Copy

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Haver	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15-0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-
Raaigras m.u.v. Engels raaigras	Direct na zaaien	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 l/ha per 12 maanden	-	-
Zwenkgras	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 l/ha per 12 maanden	-	-
Beemdgras	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 l/ha per 12 maanden	-	-
Timothee, Kropaar, Struisgras, Kamgras, Ruwe smele, Fakkelgras, Festulolium	Direct na zaaien	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 l/ha per 12 maanden	-	-
Oliehoudende zaden	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	-
Vezelgewassen	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teelcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	
Vlinderbloemige groenbemesters	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teelcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	
Rogge, Japanse haver (grasachtige groenbemesters)	Voor of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teelcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	

COPY

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Facelia, Spurrie, Afrikaantjes, Raketblad, Sudangras, Deder, Bladraap, Zwaardherik, Niger (groenbemesters)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teelcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	
Klaver (voedergewassen)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-	-
Meekrap	Tijdens vegetatieve rustperiode	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Miscanthus	Tijdens vegetatieve rustperiode	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Olifantsgras	Tijdens vegetatieve rustperiode	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Russische Paardenbloem (rubberwinning)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,04 – 0,2 L/ha	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	6	-
Graszodenteelt	Voor of na opkomst	Voor of na opkomst	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per 12 maanden	0,1 L/ha per 12 maanden	-	
Kweepeer (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook[1]	0,3 L/ha [2]	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	
Mispel (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook[1]	0,3 L/ha [2]	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	

Copy

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Steenvruchten (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook[1]	0,3 L/ha [2]	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden	-	
Aardbei (onbedekte teelt)	1-3 weken na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,3-0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Klein fruit m.u.v. aardbei (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	100
Noten (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha zwartstrook[1]	0,3 L/ha [2]	1 per 12 maanden	0,3 L/ha per 12 maanden		
Boon zonder peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	
Erwt zonder peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,1 L/ha	0,1 L/ha	1 per teeltcyclus	0,1 L/ha per teeltcyclus	-	
Augurk (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	
Courgette (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	
Pompoen-achtigen (onbedekte teelt)	Na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 L/ha	0,5 L/ha	1 per teeltcyclus	0,5 L/ha per teeltcyclus	-	90

Copy

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Suikerwortel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Aardpeer (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Japanse aardappel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Zoete aardappel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Rode biet (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Schorseneer (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	

Copy

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Yam (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per teeltcyclus	0,15 L/ha per teeltcyclus	-	
Eerstejaars plantui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Tweedejaars plantui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Zilverui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Picklers (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Sjalotten (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	7	
Bosui (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-

Copy

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Knoflook (onbedekte teelt)	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teeltcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-
	Na opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teeltcyclus		7	
Asperge (onbedekte teelt)	Na het planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 L/ha	0,25 L/ha2	1 per 12 maanden	0,25 L/ha per 12 maanden	-	-
Rabarber (onbedekte teelt)	Tijdens vegetatieve rustperiode	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,4 L/ha	0,4 L/ha	1 per 12 maanden	0,4 L/ha per 12 maanden	-	-
Prei (onbedekte teelt)	Na zaaien	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,3 L/ha	0,3 L/ha	1 per teelcyclus	0,3 L/ha per teeltcyclus	-	-
			0,05-0,1 L/ha	0,1 L/ha	4 per teelcyclus		7	-
Aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	30
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-
Medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt)	Na opkomst / na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,15 L/ha	0,15 L/ha	1 per 12 maanden	0,15 L/ha per 12 maanden	-	-

COPY

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. de vermeerderingsteelt van tulp en lelie (onbedekte teelt)-	Na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Lelie m.u.v. de tweedejaarsteelt (onbedekte teelt)	Na planten, voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per teelcyclus	0,2 L/ha per teeltcyclus	-	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Boomkwekerijgewassen m.u.v. coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 L/ha[1] zwartstrook	0,5 L/ha[2]	1 per 12 maanden	0,5 L/ha per 12 maanden	-	-
			0,1-0,3 L/ha[1] zwartstrook	0,15 L/ha[2]	2 per 12 maanden		7	
			0,1-0,2 L/ha[1] zwartstrook	0,1 L/ha[2]	4 per 12 maanden		7	
Coniferen (onbedekte teelt)	Na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha[1] zwartstrook	0,5 L/ha[2]	1 per 12 maanden	1 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-	-
Kerstbomen (onbedekte teelt)	Na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1,0 L/ha[1] zwartstrook	0,5 L/ha[2]	1 per 12 maanden	1 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling na planten	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5-1 L/ha[1] zwartstrook	0,5 L/ha[2]	1 per 12 maanden	1 L/ha zwartstrook per 12 maanden	-	-

COPY

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Na planten of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Na planten of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,2 L/ha	0,2 L/ha	1 per 12 maanden	0,2 L/ha per 12 maanden	-	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

[1] Bespuiting alleen op de (zwart)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per “behandeld oppervlak” ((zwart)strook) toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een percentage is van het totale perceel.

[2] Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.

Copy

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.

Bijproducten van behandelde vezelgewassen, zoals lijnzaad, niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.

Behandelde medicinale kruidgewassen en medicinale wortelgewassen alleen gebruiken voor homeopathische of medicinale doeleinden.

In de teelt van voedergrasland en grasvegetatie het middel toepassen voor het ontvouwen van het eerste blad (BBCH 11).
In de teelt van uien, sjalotten en knoflook het middel toepassen vanaf het uitplanten of het kiemhaakstadium (BBCH 9).
In de teelt van boon zonder peul en erwt zonder peul het middel toepassen tijdens het ontvouwen van het tweede tot vierde blad (BBCH 12-14).
In de teelt van augurk en courgette het middel toepassen bij het ontvouwen van het derde blad (BBCH 13).

De werkzaamheid in wintergranen kan sterk afnemen in geval van een watertekort.
In grasvegetatie bij droogte de toepassing met het middel volgen met een bespuiting met water.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Na het mislukken van de teelt van wintergraan kan graan of gras worden ingezaaid. Als volggewas wordt de teelt van kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad) afgeraden.

In de teelt van coniferen en kerstbomen het middel alleen toepassen op goed bewortelde planten. Op zaaibedden in de boomkwekerij kan het middel niet worden toegepast.

Bij bloemisterijgewassen is er ervaring in een beperkt aantal soorten en cultivars. Om risico op fytotoxiciteit te voorkomen wordt aangeraden altijd eerst een proefbespuiting uit te voeren in de betreffende soorten/cultivars.

LEGE VERPAKKING

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

STORL
1
PET

WERKINGSSPECTRUM

AZ™500 moet toegepast worden vóór het kiemen van de onkruiden. AZ™500 is alleen werkzaam tegen kiemende eenjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals akkervioolte, brandnetels, dovenetels, ereprijs, herderstasje, herik, kamille, kruiskruid, spurrie, postelein en duizendknopigen. Na opkomst van deze onkruiden worden ze niet meer bestreden, met uitzondering van kleine veldkers. AZ™500 werkt niet tegen grassen. De werkzaamheid van AZ™500 is afhankelijk van de neerslag na de behandeling. Het resultaat kan tegenvallen in het geval van een gebrek aan water.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.

Een groot aantal toegelaten gebruiken betreffen kleine teelten (zie tabel in WG). Voor deze teelten zijn geen selectiviteitsproeven uitgevoerd. Voer altijd een proefbespuiting uit. De verantwoordelijkheid ligt bij de toepasser.

Let op dat composieten (zoals bijvoorbeeld witlof, cichorei, paardenbloem, ...) tot en met het kiemlob stadium zelf ook gevoelig zijn voor AZ™500. AZ™500 kan in deze gewassen enkel toegepast worden vanaf volledige opkomst van het gewas. De verantwoordelijkheid voor een juiste toepassing ligt bij de toepasser. Voer altijd een proefbespuiting uit, ook al is het gewas volledig opgekomen.

COPY

In aardbei (onbedekte teelt)
AZ™500 toepassen na het planten van het gewas en vóór opkomst van de onkruiden. Toepassen op goed bewortelde planten. In vermeerderingspercelen kan het ingroeien van de nieuwe loten in de grond worden gehinderd door toepassing van AZ™500. Gebruik op vermeerderingsstroken wordt daarom afgeraden.

In appel, peer, kweepeer, mispel en steenvruchten (onbedekte teelt)
AZ™500 toepassen op de naakte zwartstroken, vóór de opkomst van de onkruiden, tot het einde van de bloei (BBCH 00-69).

In boomkwekerijgewassen (muv coniferen en kerstbomen) (onbedekte teelt), coniferen, kerstbomen en vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
Toepassen op goed bewortelde planten in de winter of de lente.

In klaver (voedergewassen)
Toepassen vanaf het kiemlobstadium (> BBCH 10). Bij voorkeur gebruiken op een vochtige grond of op een later tijdstip gemengd met een contactherbicide. Omwille van de variëtale gevoeligheden is het noodzakelijk om een voorafgaande proefbespuiting uit te voeren.

In prei (onbedekte teelt)
Toepassen in zaaiprei vanaf opkomst van het gewas.
Toepassen in plantprei na het uitplanten.
Om optimaal van de werking van AZ500 gebruik te maken adviseren we het middel in de eerste periode na planten / na opkomst toe te passen. Een wachttijd van minimaal 90 dagen moet altijd gerespecteerd worden.

In Russische paardenbloem (rubberwinning)
Toepassen na volledige opkomst, tot 6-blad stadium.

In wintergraan muv winterrogge en kanariezaad
Toepassen vanaf vooropkomst tot het 3-bladstadium (BBCH 01-13).

1 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Alle teelten	Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Boomkwekerijgewassen	Gebruik minimaal DRT90 op alle percelen om niet doelwit planten te beschermen.

2 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN / VERVANGGEWASSEN

Na het mislukken van de teelt van wintergraan kan graan of gras worden ingezaaid. Als volggewas wordt de teelt van kruisbloemigen (koolgewassen, koolzaad) afgeraden.
Het is niet uitgesloten dat na toepassing van het middel in een kortdurende teelt de actieve stof na oogst van het gewas nog niet volledig is afgebroken in de bodem. Na een kortdurende teelt (zoals uien dat kunnen zijn) kan zonder kerende grondbewerking veilig een graan of gras worden ingezaaid. Voorafgaand aan een nateelt van een ander gewas dan graan of gras, wordt geadviseerd een intensieve (10-15cm) dan wel een kerende grondbewerking uit te voeren.

3 - VEILIGHEIDSTERMIJN

De volgende wachttermijnen voor de oogst moeten gerespecteerd worden:
In kleinfruit (m.u.v. aardbei): 100 dagen
In prei (plant- en zaaiprei): 90 dagen

4 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van AZ™ 500, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. Kruisbloemigen zoals koolgewassen en koolzaad zijn zeer gevoelig. Deze lijst is niet volledig.
Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

COPY

Raadpleeg de «Toolbox Emissiebeperking» op www.toolboxwater.nl. voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

5 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

6 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. Een arts raadplegen.

NA INADEMING:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

Copy