CORTEVA™
agriscience

Tapir™

HERBICIDE

GROUP	2	4	HERBICIDE

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN GRANEN, GRASZAADTEELT, VOEDERGRASLAND, GRASVEGETATIE

Aard van het preparaat: EC – emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof: florasulam + clopyralid + fluroxypyr-meptyl
Gehalte: 2,5 g/L + 80 g/L + 144,1 g/L
Professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 15258N (W2)

STORL
1
PET

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

Lotnummer : zie op de fles

Toelatingshouder :
Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom,
Nederland
Website: www.corteva.nl

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

5 L e

0292742

2502

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Werkzaam-heid getoetst op	Dosering* (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassin-gen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheid-stermijn in dagen
Wintergraan (m.u.v. kana-riezaad)	Breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Zomergraan	Breedbladige onkruiden	1,0 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Graszaadteelt	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-
Voeder-grasland	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	7 dagen tussen toepassing en bewei-ding en/of maaien
Grasvegetatie	Breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Copy

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van graszaadteelt, voedergrasland en grasvegetatie het middel toepassen in 200-400 L water/ha.

In wintergranen (met uitzondering van kanariezaad) en in zomertarwe en zomergerst toepassen vanaf ontvouwen vierde blad tot vlagbladstadium (BBCH 13-39). In zomerrogge en haver toepassen vanaf ontvouwen vierde blad tot 2-knoopstadium (BBCH 13-32).

Stro van behandeld graan en behandeld gras mag niet gebruikt worden voor mulching, compostering of teelt op strobalen.

Bij gevestigd voedergrasland en grasvegetatie is toepassing toegestaan gedurende het groeiseizoen. Bij jong voedergrasland en grasvegetatie is na-opkomst toepassing toegestaan vanaf februari tot en met september.

Volggewassen
Als volggewas kunnen in hetzelfde jaar veilig granen, koolzaad en koolgewassen (geplant) en gras geteeld worden, in koolzaad is een tijdelijke licht groeiremming mogelijk. In het volgende jaar gelden geen beperkingen.

Resistentiemanagement:
Dit middel bevat de werkzame stoffen clopyralid, fluroxypyr-meptyl en florasulam. Clopyralid behoort tot de synthetische auxinen en fluroxypyr behoort tot de pyridine carboxylic acids, beide behoren tot HRAC code O. Florasulam behoort tot de triazolopyrimidines (HRAC code B). In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code B. Omdat er binnen deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

LEGE VERPAKKING

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

STORL
1
PET

WERKINGSSPECTRUM

TAPIR™ is een bladherbicide met systemische werking. Het middel werkt door de combinatie van 3 werkzame stoffen tegen een breed scala aan breedbladige onkruiden. Gevoelige onkruiden zijn bijv. paardenbloem, muur, ridderzuring, kamille, klein kruiskruid, akkermelkdistel, akkerdistel, kleefkruid, herderstasje, kleine veldkers, brandnetel, hennepnetel, zwaluwtong, perzikkruid, varkensgras, zwarte nachtschade en haag- en akkerwinde.

Attentie
Het middel kan schade doen aan naburige gewassen bij overwaaien van de spuitvloeistof; de toepassing dient daarom zorgvuldig te geschieden.

CDV

GEBRUIKSAANWIJZING

In voedergrasland
Onder voedergrasland wordt verstaan: weiland en maaigrasland.
Dosering: 1,25 - 1,5 L/ha.

Tegen zuring de hoogste dosering gebruiken (1,5 L), gespoten als de zuringplanten veel blad hebben (zuring minimaal 30 cm groot) bij groeizame weerscondities (hoge RV en T > 15°C). Ter versterking op zuring kan eventueel nog 0,3 L Starane™ Top worden toegevoegd aan de 1,5 L TAPIR™ per ha.

De toepassing kan plaatsvinden in het voorjaar, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten vanaf ± 3 weken na een maaibeurt.

In granen
TAPIR™ kan versterkt worden tegen meldes met een daartegen werkzaam graanherbicide. Menging met de meeste fungiciden en groeiregulatoren is mogelijk. TAPIR™ is een EC formulering. Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij een snelgroeiend gewas onder scherp zonnige omstandigheden, kan bij menging van een triazool met een EC een tijdelijke gewasreactie optreden.

In wintergranen (met uitzondering van kanariezaad), zomertarwe en zomergerst toepassen vanaf ontvouwen vierde blad tot vlagbladstadium (BBCH 13-39).
Dosering: 1L/ha.

In zomerrogge en haver toepassen vanaf ontvouwen vierde blad tot 2-knoopstadium (BBCH 13-32).
Dosering:1 L/ha

In graszaadteelt
De toepassing kan plaatsvinden vanaf 3-bladstadium, van februari tot en met september.
Dosering: 1,5 L/ha

In grasvegetatie
Onder grasvegetatie wordt verstaan gazons, speelweides, grasbermen en sportvelden (incl. graszodenteelt en golfterreinen). Toepassen vanaf het 3-bladstadium.
Dosering: 1,5 L/ha

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het beste resultaat wordt verkregen op goed groeiende onkruiden, dus bij groeizame weersomstandigheden. Het middel dient verspoten te worden op een droog gewas.

Einde van de behandeling ← 1 uur → regen

Copy

2 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN / VERVANGGEWASSEN / STROGEBRUIK

- Indien na de oogst het stro niet wordt afgevoerd, dan dient het stro in het najaar goed ingewerkt te worden.
- Het stro niet als voedingsbodem voor paddestoelenteelt gebruiken.
- Gebruik het stro (of compost van stro) niet voor het afdekken van gevoelige gewassen zoals snijbloemen, sla en peulvruchten.
- Residuen van de werkzame stof clopyralid in gewasresten die niet volledig zijn verteerd kunnen een effect hebben op het volggewas aardappelen in de vorm van een lichte gewasreactie. Dit kan met name bij pootaardappelen problemen geven bij selectie/keuring. Zorg er daarom in deze situatie voor dat gewasresten goed verteerd of afgevoerd zijn.
- Gebruik TAPIR™ NIET op gazons, sportvelden of golfterreinen waarvan het maaisel wordt verzameld voor gebruik als groenafval, compost, mulch of bodemverbeteraar, aangezien residuen van dit product in plantenmateriaal dat niet volledig is afgebroken, schade kan toebrengen in gewassen die gevoelig zijn voor clopyralid.

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL EN SPUITOVERSCHOTTEN

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van TAPIR™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca.10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral nauwkeurig worden berekend.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

COPY

5 - EERSTE-HULP MAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INDADEMING:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken.
Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

COPY

CORTEVA™
agriscience

Tapir™

3 362130 136156 >

HERBICIDE

UFI: AXS3-S01X-Q001-XX10

Koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen

GEVAAR

GHS08

GHS09

GEVARENAANDUIDINGEN

H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P280	Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301+P310	NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P331	GEEN braken opwekken
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Copy

0288945

2408

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

5 L e