

Starane™ Forte

Arylex™ active

HERBICYD

Brzytwa na przytulię, jasnoty i dymnice! Starannie wygoli chwasty


- /// Starane - brzmi znajomo? Teraz w odsłonie Forte. Z najnowszą substancją czynną – Arylex™ active.
- /// To brzytwa na przytulię czepną i inne chwasty!
- /// Przytulię zwalcza w każdej fazie!
- /// Szybki, prosty i ekonomiczny sposób na czyste, STARANNIE wygolone z chwastów pole!



Zalecane dawkowanie:

Zboża ozime i jare (pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto)

Starane™ Forte dawka 0,25–0,5 l/ha




- 0,375 l/ha – najkorzystniej!
- 0,5 l/ha – przy zwalczaniu np. chabry bławatka
- 0,25 l/ha – sporządzając mieszaniny z innymi herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne w celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów

Zawartość substancji czynnych [g/l]	Arylex™ active 12 g	Fluroksypyr 280 g
Mechanizm działania wg HRAC	0	0
Formulacja	płynna, EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)	
Zakres stosowania	wszystkie gatunki oraz odmiany zbóż ozimych i jarych (oprócz owsa)	
Termin aplikacji	wiosna, BBCH 13–45 (od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego zbóż)	
Zalecane dawki	0,25–0,5 l/ha w zależności od zwalczanych chwastów i sposobu aplikacji lub partnera	
Zalecane temperatury stosowania	2–25°C	
Odporność na zmywanie	1 godzina	
Zalecana ilość wody	100–400 l/ha	
Następstwo roślin	brak zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (patrz etykieta)	

Sprawdź, nad którymi chwastami przejmiesz pełną kontrolę!

Dawka	Chwasty wrażliwe
0,25 l/ha	dymnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna*
0,375 l/ha	przytulia czepna, komosa biała*
0,5 l/ha	chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity, rdestówka powojowata*

* Dawka preparatu zależy od uprawy, w której będzie stosowany oraz fazy rozwojowej. Więcej szczegółów znajduje się w etykiecie-instrukcji stosowania.



chaber
bławatek

(*Centaurea
cyanus*)



dymnica
pospolita

(*Fumaria
officinalis*)



jasnota
purpurowa

(*Lamium
purpureum*)



gwiazdnica
pospolita

(*Stellaria
media*)



komosa
biała

(*Chenopodium
album*)



mak
polny

(*Papaver
rhoeas*)



przytulia
czepna

(*Galium
aparine*)



rdestówka
powojowata

(*Fallopia
convolvulus*)



tasznik
pospolity

(*Capsella
bursa-pastoris*)

Starane™ Forte – unikatowa formuła bazująca na innowacyjnej substancji czynnej Arylex™ active zapewnia szereg korzyści



Osiągniesz wysoką skuteczność działania, pracując nawet przy 2°C.

Nie zmieniaj planów, spiętrzenie prac Cię nie dotyczy! Nagłe spadki temperatury nie są już przeszkodą w wykonywaniu zabiegów zwalczających chwasty. Rozpoczniesz wczesnowiosenne prace z wyprzedzeniem, a w sytuacji wystąpienia niskich temperatur nie będziesz musiał przerywać zabiegów.



Wykonasz zabieg nawet godzinę przed deszczem.

Dzięki natychmiastowemu działaniu i szybkiemu pobraniu przez chwasty niespodziewany deszcz nie spowoduje zmniejszenia skuteczności zabiegu.



Zaczniesz opryskiwanie nawet 2–3 tygodnie przed standardowym terminem aplikacji herbicydów, co dodatkowo pomoże Ci efektywnie kontrolować chwasty szybko przechodzące do fazy generatywnej (kwitnienia), np. jasnoty, gwiazdnica pospolita.



Zyskasz kontrolę nad szerokim spektrum kluczowych chwastów dwuliściennych występujących powszechnie po zabiegach jesiennych.



Oszczędzisz czas, wodę i paliwo.

Podczas wczesnej aplikacji możesz użyć tylko 100–150 l wody na hektar zamiast zwyczajowych 200 l/ha. Umożliwi to opryskanie dodatkowych 30–100% powierzchni więcej, przy jednym napełnieniu opryskiwacza.



Obniżysz koszty.

Jeśli zaczniesz odpowiednio wcześniej, chwasty będą w niskich fazach rozwojowych, a dzięki temu wystarczy mniejsza dawka Starane™ Forte, by je zwalczyć.



Zyskasz większe plony.

Wczesne wyeliminowanie chwastów z pól umożliwi optymalny rozwój roślinom uprawnym.



Nie będziesz miał ograniczeń w doborze roślin następczych.



Przejmiesz kontrolę nad populacją chwastów dwuliściennych mało wrażliwych na dotychczas używane rozwiązania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.