

# Gullviks™ Prima

## OGRÄSMEDEL

### Faroangivelser:

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
EUH208 Innehåller pyroxsulam och klokvintocet-mexyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
64 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet.  
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

### Skyddsangivelser:

P391 Samla upp spill. P501 Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

### Första hjälpen:

Se produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

### Verksamma beståndsdelar:

Florasulam 22,8 g/kg (2,28% vikt-%).  
Pyroxsulam 68,3 g/kg (6,83% vikt-%).

**Beredningsform:** WG - Vattendispergerbart granulat.

**Lagring:** Förvaras frostfritt och i tilsloten förpackning.

**Tomemballage:** Tom förpackning får inte återanvändas.

**Satsnummer och tillverkningsdag:** Se behållaren.

Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

### Varning



## NETTOMÄNGD: 1 KG

™ ® Trademarks of Corteva  
Agriscience and its affiliated  
companies.

50X20MM MINIMUM  
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE  
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)



# Gullviks™ Prima

## OGRÄSMEDEL

|       |       |           |
|-------|-------|-----------|
| GROUP | 2 (B) | HERBICIDE |
|-------|-------|-----------|

UFI: HF59-303R-C00C-63Y0

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

### ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mot ogräs i höstvet, vårvete, höstråg och rågvete.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

### Bekämpningsmedel klass 2L

Parallellhandelstillstånd nr PHT-0025-4954

Ursprungsprodukt Broadway, reg. nr. 64-69

**Innehavare:** Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark,  
tlf. +45 4528 0800

**Importör:** Corteva Agriscience AB,  
Box 7199, 103 88 Stockholm, [www.corteva.se](http://www.corteva.se)

©™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETTOMÄNGD: 1 KG**



3 362130 180142 >

298999 2602  
SWEDEN

## **Bruksanvisning**

Gullviks PRIMA är en systemisk bladherbicide för bekämpning av gräs- och örtogräs i höstvet, höstråg, rågvete och vårvete på våren. Produkten bekämpar bl.a. åkerven, flyghavre, engelskt rajgräs, kärrgröe, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda, veronika, åkerviol, våtarv, kornvallmo och blåklint. Gullviks PRIMA får inte användas där blandningar innehållande klöver, lusern eller andra baljväxter har såtts samt i gräsinsådd.

## **Verkningssätt**

Gullviks PRIMA är en WG formulering, innehållande 68,3 g/kg pyroxsulam och 22,8 g/kg florasulam. Florasulam och pyroxsulam är båda ALS-hämmare, vilket är ett verkningssätt som förhindrar plantan att producera viktiga aminosyror, vilket leder till att plantan dör.

## **Klimatförhållande och användning**

Behandling med Gullviks PRIMA ska ske på våren, när ogräset är i god tillväxt och fuktigheten är normal. Då Gullviks PRIMA huvudsakligen upptas genom bladen bör det vid behandlingen säkras att bladytan täcks. Under mycket torra förhållanden eller vid låg temperatur, då tillväxten i ogräset är begränsad, kan Gullviks PRIMA ge en nedsatt effekt.

För att uppnå optimal effekt i höstsäd, rekommenderas behandling senast vid BBCH 32.

Undvik att spruta när grödan är stressad av kyla, torka, vattenmättad jord, angripen av skadedjur, lider brist på näringsämnen etc. Behandling av stressad gröda kan medföra en övergående ljusfärgning av grödan.

## Doserings- och användningsvägledning

| Grödor                         | Tidpunkt<br>BBCH                 | Dosering            | Bekämpningsbara<br>ogräsarter                                                                                                                                           | Effekt        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Höstvete<br>Höstråg<br>Rågvete | 21-39<br>Endast<br>vårbehandling | 165 g/ha +<br>PG26N | Åkerven, spillraps,<br>lomme, snärjmåra,<br>kamomill,<br>baldersbrå,<br>åkerförgätmigej,<br>vallmo, pilört<br>(vanlig), åkerpilört,<br>åkersenap, våtarv,<br>penningört | >95 %         |
|                                |                                  |                     | Renkavle, blåklint,<br>engelskt rajgräs,<br>kärrgröe, korsört                                                                                                           | 85-<br>94,9 % |
|                                |                                  |                     | Sandlostä,<br>luddlostä,<br>rödplister,<br>italienskt rajgräs,<br>trampört,<br>åkerbinda,<br>trädgårdsveronika,<br>åkerviol                                             | 70-<br>84,9 % |
|                                |                                  |                     | Kvickrot <sup>1</sup>                                                                                                                                                   | 50-<br>69,9 % |

| Grödor                        | Tidpunkt<br>BBCH                                           | Dosering            | Bekämpningsbara<br>ogräsarter                                                                                                                                                   | Effekt        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Höstvete<br>Höstråg<br>Rågvet | 21-39<br>Endast<br>vårbehandling                           | 220 g/ha +<br>PG26N | Åkerven, spillraps,<br>lomme, snärjmåra,<br>kamomill,<br>baldersbrå,<br>åkerförgätmigej,<br>vallmo, pilört<br>(vanlig), åkerpilört,<br>åkersenap, våtarv,<br>penningört         | >95 %         |
|                               |                                                            |                     | Renkavle,<br>luddlosta, blåklint,<br>rödplister,<br>italienskt rajgräs,<br>engelskt rajgräs,<br>trampört,<br>åkerbinda,<br>kärrgröe, korsört,<br>trädgårdsveronika,<br>åkerviol | 85-<br>94,9 % |
|                               |                                                            |                     | Kvickrot <sup>1</sup> ,<br>flyghavre <sup>2</sup> ,<br>sandlosta, näva                                                                                                          | 70-<br>84,9 % |
|                               |                                                            |                     | Råttsvingel                                                                                                                                                                     | 50-<br>69,9 % |
|                               | Delad behandling - Endast vårbehandling                    |                     |                                                                                                                                                                                 |               |
|                               | 1:a behandling,<br>vid tillväxtens<br>början<br>BBCH 20-32 | 110 g/ha +<br>PG26N | Sandlosta                                                                                                                                                                       | 85-<br>94,9 % |
|                               | 2:a behandling,<br>10-14 dagar<br>senare<br>BBCH 20-32     | 110 g/ha +<br>PG26N |                                                                                                                                                                                 |               |

| Grödor  | Tidpunkt<br>BBCH | Dosering            | Bekämpningsbara<br>ogräsarter                                                                                                                                              | Effekt        |
|---------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vårvete | 21-32            | 150 g/ha +<br>PG26N | Åkerven,<br>flyghavre <sup>2</sup> , lomme,<br>målla, snärjmåra,<br>baldersbrå,<br>åkerförgätmigej,<br>pilört (vanlig),<br>åkerpilört, våtarv,<br>penningört,<br>åkersenap | >95 %         |
|         |                  |                     | Pipdån, åkerbinda                                                                                                                                                          | 85-<br>94,9 % |
|         |                  |                     | Rödlister, åkerviol                                                                                                                                                        | 70-<br>84,9 % |

<sup>1</sup> Gullviks PRIMA har effekt på kvickrot i 3-4 bladstadiet vid behandlingstillfället och det rekommenderas att göra en uppföljning med glyfosat efter skörd för att säkra kontrollen över kvickroten.

<sup>2</sup> Gullviks PRIMA har endast effekt på flyghavre som är uppkommen vid behandlingstillfället.

Gullviks PRIMA får endast användas 1 gång per odlingsår – delad behandling tillåtet enbart vid behandling mot sandlosta.

### Additiv

Gullviks PRIMA ska alltid användas tillsammans med PG26N. Se etikett PG26N.

### Jordarter

Gullviks PRIMA kan användas på alla jordtyper.

### Regnfasthet

Gullviks PRIMA är regnfast efter 1 timme.

### Blandningar

Gullviks PRIMA ska inte blandas med produkter innehållande fenoxaprop-pethyl eller tillväxtreglerare innehållande trinexapak etylester, mepiqvatklorid eller etifon. En behandlingsintervall på 7 dagar mellan behandlingar är att rekommendera.

## Omsådd

Vid omsådd kan det sås stråsäd och majs.

## Efterföljande gröda

Gullviks PRIMA har inga restriktioner för vilken gröda som sås på den efterföljande hösten eller våren.

## Rekommenderad skyddsutrustning vid användning:

**Vid beredning/rengöring:** Använd halvmask, gasfilter A2 brun och partikelfilter P2, skyddsglasögon, överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar.

**Vid sprutning:** Med sprutbommen mindre än 1 meter över marken, monterad på traktorn eller liknande, samt när arbetet utförs utanför eller utan förarhytt används överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar. Vid sprutning med sluten hytt (ventilationsanläggning ska vara avstängd) ska det inte användas särskild skyddsutrustning.

Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel.

## Sprutteknik och vätskemängd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren finns på [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se).

Gullviks PRIMA ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av spruttillverkaren.

Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en sprutteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

## Beredning av sprutvätska

Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning och fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd Gullviks PRIMA genom påfyllningshålet.

Håll kontrollerat med långsamt flöde på så stor del av vätskeytan i tanken som möjligt. Undvik att hålla preparatet på slangar och sprinklers i tanken. PG26N tillsätts alldeles innan tanken blir full.

**Preparatpåfyllare:** Vid användning av preparatpåfyllare, tillsätts rekommenderad mängd preparat genom att kontrollerat hålla granulatet direkt i öppningen på bottenventilen. Undvik att granulatet fastnar på de inre delarna genom att låta flödessystemet köra under påfyllningen. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns. PG26N tillsätts alldeles innan tanken blir full.

**Preparatdoserare:** Vid användning av preparatdoserare hänvisas användaren till spruttillverkarens rekommendationer.

### **Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning**

**Observera!** Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt sköljvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear<sup>®</sup> Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta ut lite av sköljvattnet genom slangar, ramp och munstycke så de blötläggs. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.

- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear<sup>®</sup> Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

### **Utvändig rengöring av sprutor**

Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/ tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

### **Resistensstrategi**

| Produktnamn    | Typ      | Verksam substans         | HRAC grupp | Risk för utveckling av resistens |
|----------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| Gullviks PRIMA | HERBICID | Pyroxsulam<br>Florasulam | 2 (B)      | Hög                              |

Corteva Agriscience rekommenderar en stark anti-resistens strategi. För att undvika resistensutveckling rekommenderar Corteva Agriscience, att det generellt används ogräsmedel med olika verkningssätt i växtföljden – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.

### **Lagring**

Ska lagras frostfritt och i tillsluten förpackning.

### **Tomma emballage**

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet håller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar.

Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (svepretur.se).

Corteva Agriscience AB är medlem av Svenskt Växtskydd.

<sup>3</sup> Varumärke - Adama

<sup>4</sup> Varumärke - Syngenta

<sup>5</sup> Varumärke - Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.

<sup>6</sup> Varumärke - FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
INTENTIONALLY BLANK**

# Gullviks™ Prima

## OGRÄSMEDEL

|       |       |           |
|-------|-------|-----------|
| GROUP | 2 (B) | HERBICIDE |
|-------|-------|-----------|

UFI: HF59-303R-C00C-63Y0

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

### ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mot ogräs i höstvet, vårvete, höstråg och rågvete.

**All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.**

**Bekämpningsmedel klass 2L**

**Parallellhandelstillstånd nr PHT-0025-4954**

**Ursprungsprodukt Broadway, reg. nr. 64-69**

**Innehavare:** Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark,  
tlf. +45 4528 0800

**Importör:** Corteva Agriscience AB,  
Box 7199, 103 88 Stockholm, [www.corteva.se](http://www.corteva.se)

®™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETTOMÄNGD: 1 KG**



3 362130 180142 >

298999 2602  
SWEDEN

**NO PRINT – GLUE PAGE**