İmal Tarihi: Şarj Numarası:
Son Kullanma Tarihi: Ruhsat Tarihi ve Numarası: 19.01.2011 / 8196

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	YABANCI OT		UYGULAMA DOZU
BUĞDAY	Kan damlası	*Adonis aestivalis*	3 g/da
	Avusturya papatyası	*Anthemis austriaca*	
	Boylu papatya	*Anthemis altissima*	
	Kokarot	*Bifora radians*	
	Gökbaş	*Centaurea depressa*	
	Köy göçüren	*Circium arvense*	
	Tarla hezeranı	*Consolida regalis*	
	Uzun süpürge otu	*Descurainia sophia*	
	Dil kanatan	*Galium aparine*	
	Boynuzlu yoğurt otu	*Galium tricornutum*	
	Ballıbaba	*Lamium amplexicaule*	
	Kokulu sarı yonca	*Melilotus officinalis*	
	Hakiki papatya	*Matricaria chamomilla*	
	Gönül hardalı	*Myagrum perfoliatum*	
	Büyük gözenekli haşhaş	*Papaver macrostomum*	
	Gelincik	*Papaver rhoeas*	
	Meryem dikeni	*Silybum marianum*	
	Adi fiğ	*Vicia sativa*	
ARPA	Boylu papatya	*Anthemis altissima*	3 g/da
	Gökbaş	*Centaurea depressa*	
	Doğu tarla hezeranı	*Consolida orientalis*	
	Uzun süpürge otu	*Descurainia sophia*	
	Dil kanatan	*Galium aparine*	
	Ballıbaba	*Lamium amplexicaule*	
	Hakiki papatya	*Matricaria chamomilla*	
	Trakya hardalı	*Neslia apiculata*	
	Büyük gözenekli haşhaş	*Papaver macrostomum*	
	Gelincik	*Papaver rhoaes*	
	Sarı ot	*Boreava orientalis*	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

LANCELOT® SUPER suda dağılabilen granül formülasyonda bir ilaç olduğundan ilacın suda erimesi çok önemlidir. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki LANCELOT® SUPER'i bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz. Dekara 20-40 L su ile uygulma yapınız. Yelpaze hüzmeli meme kullanınız.

KALİBRASYONU

Tavsiye edilen dozun dekara doğru ve homojen bir şekilde uygulanabilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığını ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğünü, memelerin altına koyacağınız kaplarda birikecek olan su miktarının her meme için aynı olmasını sağlayarak kontrol ediniz. İlaçlama aletinin deposunu ilaçsız temiz suyla doldurunuz ve ardından ilaçlama yapar gibi sabit bir hızla giderek, belirli bir alanı ıslatınız. Daha sonra, ıslatılan alan ve harcanan su miktarını ölçerek, bir depo dolusu su ile ilaçlanabilecek toplam alan ve gerek duyacağınız bitki koruma ürünü miktarını hesaplayanız. Bitki koruma ürününü "Uygulamaya Hazırlama" bölümünde açıklandığı gibi hazırlayarak aletin deposuna boşaltınız. Daha sonra ölçüm yaparken kullandığınız hız ve viteste ilaçlamaya geçiniz.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen boşaltınız; tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Dışını su ile durulayınız. Görülen tüm artıkları, filtreler ve memeleri temiz su ile yıkayınız. Yıkama sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayınız.

Devamı 2. Sayfada...

CORTEVA™ agriscience

LANCELOT®SUPER

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	O	B	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

%30 aminopyralid + %15 florasulam

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülen zehirlenme belirtileri ile karşılaşılmaz. Cilt ve gözde tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM BİLGİLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalanın bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice yıkayın, ilk 1-2 dakikadan sonra eğer varsa kontak lensleri çıkartınız ve 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Gecikmeden bir göz doktoruna danışın.

Deri ile temas etmesi halinde: Hemen cildinizi sabun ve bol su kullanrak yıkayınız. Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız. Kirlenen ayakkabı ve diğer deri malzemeler, eğer bulaşıklığı giderilemeyecek ise uygun şekilde imha edilmelidir.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, **ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN**: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

™® Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: aminopyralid, florasulam

DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302/352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P333/313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- En iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır.
- İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm'den daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Sucul organizmalara zehirlidir; sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
- Olumsuz meteorolojik koşullar, parazit saldırısı vb. nedenlerle mahsulün zarar görmesi durumunda, LANCELOT® SUPER uygulamasından bir ay sonra mısır, sorgum ve diğer buğdaygillerin ekilmesi mümkündür. Müteakip mahsulleri ekmeden önce toprağın mutlaka pullukla derin sürülmesi gerekir.
- Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Serin, kuru, iyi havalanan ve güneş görmeyen yerlerde; açılmamış orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.
- En düşük depolama sıcaklığı: 0°C'nin altında saklamayınız

DEPOLAMA DURUMU

Normal şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında asgari iki (2) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

CORTEVA™ agriscience
CORTEVA TURKEY TARIM A.S.
ANADOLU KURUMLAR V.D. - 310 000 00 66
Tic. Sicil No: 182593

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR. 12 Ağustos 2021

Sayfa 1'in Devamı...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

LANCELOT® SUPER, çıkış sonrası yabancı otların 2-8 yapraklı olduğu dönemde, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması tavsiye edilmez. Aşırı yağış dönemi ardından suya doymuş toprakta kullanmayınız. **Kültür bitkisi ve yabancıotların kuraklık, soğuk, aşırı yağış vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.**

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

LANCELOT® SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O ve B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için LANCELOT® SUPER'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O ve B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Karışıma gerek duyuluyorsa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeni ile, başka bir ürünle karıştırıp uygulamadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulaması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılarak uygulanabilir.

Karışımda kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaynaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

LANCELOT® SUPER uygulanan tarlaya:

- **1 ay sonra;** Tahıllar, mısır, sorgum sudan otu
- **Aynı yıl sonbahar;** Kışlık tahıllar, kışlık kanola, mısır, sorgum sudan otu
- **Bir sonraki ilkbahar;** Soğan, yazlık hububatlar, yazlık kanola, ayçiçeği, pamuk, patates, şeker pancarı, yonca, havuç, rezene, keten tohumu
- **14 aydan sonra:** mercimek, nohut, soya fasulyesi, tarla fasulyesi, bezelye ekilebilir.

Duyarlı mahsuller için, güvenli görülen ekim aralıkları iklim koşulları ve tarım uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Münavebe bitkileri konusunda daha fazla bilgi için firma yetkililerini arayınız.

UYGULAMA SONRASI SAP VE SAMAN YÖNETİMİ

LANCELOT® SUPER, tahılların sap ve samanlarında biriktiğinden, kalıntıları duyarlı münavebe bitkilerini etkileyebilir.

- **LANCELOT® SUPER** uygulanmış tahılların sap ve samanını pullukla toprağa karıştırınız.
- **LANCELOT® SUPER** uygulanmış tahılların sap ve samanını veya bunları tüketen hayvanların gübrelerini kompost yapımı, mantar üretimi veya malçlama amacıyla kullanmayınız.
- **LANCELOT® SUPER** uygulanmış tahılların sap ve samanını veya bunları tüketen hayvanların gübrelerini ve/veya bu gübreleri içeren kompost gibi materyalleri ekilebilir arazide veya seralarda mercimek, bezelye, yonca gibi baklagil bitkilerin ve çiçek, sebze, bağ, meyve gibi bahçe bitkilerinin yetiştiriciliği için kullanmayınız.

CORTEVA™ agriscience

LANCELOT®SUPER

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	O	B	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

%30 aminopyralid + %15 florasulam

FİRMA BEYANI:

Firma, bu bitki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA:

Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

Torre SRL.
Montalcino-Frazione Torrenieri
Siena / İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir/Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

CORTEVA™ agriscience
CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
ANADOLU KURUMLAR V.D. - 310 000 00 66
Tic. Sicil No: 182593

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

12 Ağustos 2021