

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
KANOLA	Boycu papatyası (<i>Aethemis tinctoria</i>) Tarlal papatyası (<i>Anthemis trumfetti</i>) Dilkatanan (<i>Gallium aparine</i>) Tarlal sırcası otu (<i>Knaulia integrifolia</i>) Hakkı papatyası (<i>Naricaria chamomilla</i>) Gelinçik (<i>Papaver rhoeas</i>) Meryem dikenli (<i>Silybum maritimum</i>)	30 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsye dozu üzerinden hesaplanan miktarda LONTREL® EXTRA ayrı bir kapta az miktardaki su ile iyice karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çubuğu durumdakine kadar suya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH'si 7 civarında olan temiz su kullanılması gerektirir. Uygulama tamamlanmaya kadar karışırlı işleme devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, tazyiklilerde yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamının tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

LONTREL® EXTRA, sonbaharda kanolamın 2-4 yapraklı olduğu dönemde veya ilkbaharda durgun dönemden hemen sonra yani gelişmenin yeniden başladığı ve çiçek tomurcuklarının görünür olmasından önceki dönemde olmak üzere sezonda yalnızca 1 kez kullanılır. İyileşen alanlar için uygulama sırasında hava sıcaklığının +10°C'nin üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Yabancı otların üzeri kanola yaprakları tarafından kapatıldığı zaman kullanılması halinde istenen etki alınmaz. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır, stres koşulları ortadan kalkmaya kadar beklenmelidir.

DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİ

LONTREL® EXTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnc gelişimini teşvik etmez. Bu nedenle, olası direnc gelişimini geciktirmek için LONTREL® EXTRA'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Başka bitki koruma ürünleriyle tank karışımı yapılması tavsiye edilmez. Karışma gerek duyulursa, çok sayıda bitki koruma ürünü, yayıcı-yapıştırıcı ve yaprak gübresi olması nedeniyle, başka bir ürüne karıştırılmadan önce, ön karışım denemesi ve test uygulanması yapılması önerilir; eğer fiziki bir değişiklik yoksa veya beklenmeyen bir etki görülmezse, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda tank karışımı yapılabilmektedir.

Karışma kullanılacak diğer ürün veya ürünlerin kalitesi sebebiyle kaymaklanabilecek sorunlardan CORTEVA firması sorumlu tutulamaz.



LONTREL® EXTRA

Suda çözünen Konsantr (SL)

Grubu	O	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	--------------------------------

240 g/l clopyralid + 80 g/l picloram + 40 g/l aminopyralid

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/2'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçebilmek için **Önlem İfadelerini (P280)** dikkate alınınız.

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Maruz kalınan bilinci yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.

Yutulması halinde: Tıbbi acil durum tedavisi şart değildir.

Gözler ile temas olması halinde: Gözleri açık tutarak yavaş ve yumuşak hareketlerle su içinde 15-20 dakika çalkalayınız. İlk 5 dakikadan sonra, varsa, lensleri çıkartıp gözleri çalkalamaya devam edin. Tedavi önerisi almak için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurunuz.

Deri ile temas olması halinde: Buluşuk giysileri üzerinizden çıkarın. Cildi 15-20 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Tedavi önerisi için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurunuz.

Soluması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkarın; nefes almıyorsa, acil durum merkezini veya ambulans aradıktan sonra suni solunum yapın. Suni solunum ağzından ağza yapılacaktır, uygulayıcı kurtarıcı koruması (Çep maskesi vb.) kullanılmalıdır. Tedavi önerileri için zehirlenme kontrol merkezine veya doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)YİNİZ: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

TM* Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İçindekiler: Clopyralid, Picloram, Aminopyralid.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koryucuyu eldiven/koryucuyu kıyafet/ göz koryucucu/ yüz koryucucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı yerel tüzeğe uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Uygulama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Herbisitler için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile velpaze hüzmeli memeler kullanılmamlı, uygulama aleti 3 aın den daha düşük basınçta çalıştırılmamlıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçta aletlerle uygulamaya başlamaya tavsiye edilmez.
- Baıklara zehirliidir. Yeraltı ve yer üstü sularına bulaşmamayınız.
- Tarla bitiminde dönüştürüp parken üst tüste uygulamaya yapmaktan kaçınınız.
- Boş ambalajları başka maksatlar için kullanmayınız ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz. (*Önemli İfadeleri: P501*)

MÜNAVEBE BİTKİLERİ VE SAP - SAMAN YÖNETİMİ

LONTREL® EXTRA uygulanan tarlaya:

- 1 ay sonra: Tahullar, mısır, sorgum sudan otu;
- 2 ay sonra: Kışık tahullar, kişik kanola, mısır, sorgum sudan otu;
- Bir sonraki yılın ilkbaharında: Soğan, yazlık hububatlar, yazlık kanola, ayçiçeği, pamuk, patates, şeker pancarı, yonca, havuç, rezene, keten tohumu;
- 14 aydan sonra: mercimek, nohut, soya fasulyesi, tarla fasulyesi, bezelye ekilebilir.
- Uygulama yapılmış alanlarda ürün samanın tarlada bırakınız, toplamayınız. Duyarlı mahsuller için, güvenli görülen ekim aralıkları iklim koşulları ve tarım uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Münavebe bitkileri konusunda daha fazla bilgi için firma yetkililerini arayınız

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında iki (2) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu bitki koruma ürününün belirli kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasını halinde, yazılı tavsiyelere uyduğuna garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış tabikattan, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmamasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıma aittir.

ÜRETİCİ FİRMA

Corteva Agriscience International Sâri
Route de Suisse
160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir / Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27
Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

ÜRETİM TESİSİ

Corteva Agriscience France S.A.S.
Route de Herrlisheim, 8,
Drusenheim, CS10820,
Alsace, 67410, Fransa



CORTEVA TURKEY TARIM A.S.
ANADOLU KIRIMLAR V.D. - 310 000 00 66
Tic. Sicil No: 182593

Hüseyin BÜYÜK

Ruhsatlandırma Lideri

28 Eylül 2021

