İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve numarası: 06.05.2021 / 11919

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu
Ayçiçeği	Ayçiçeği mildiyösü *(Plasmopara halstedii)*	175 ml/100 kg tohum

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Yalnızca ticari tohum ilaçlamalarında standart, kalibre edilmiş tohum ilaçlama ekipmanları ile kullanınız. Bu ürün ekim sırasında veya ekimden hemen önce ilaçlama yapabilen tohum ilaçlama ekipmanları ile kullanılmaz. Lumisena® uygulanmadan önce ilaçlama ekipmanı temizlenmiş ve bir önceki ilaç artıklarından arındırılmış olmalıdır. Lumisena® ambalajından aktarılmadan önce, ürünün homojen olmasını sağlamak için iyice karıştırılmalıdır. Lumisena® doğrudan karıştırma tankına eklenir. İyi bir kaplama elde etmek için önerilen miktarda Lumisena® gerekli miktarda suyla karıştırılır.

KALİBRASYON:
Yalnızca ticari tohum ilaçlamalarında standart, kalibre edilmiş tohum ilaçlama ekipmanları ile kullanınız. İlaçlamadan önce ekipmanın uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra, sökülmesi zor olabilecek sertleşmiş tortuların oluşma riskini azaltmak için tüm karıştırma ekipmanlarını iyice temizleyiniz. Karıştırma ekipmanını boşaltınız, iyice durulayınız ve temiz suyla yıkayınız. İlgili tüm diğer uygulama ekipmanlarını temizleyiniz. Ekipmanı temizlerken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alınız. Su kuyularının, diğer su kaynaklarının ve kültür bitkilerinin yakınlarında temizlemeyiniz. Atık durulama suyunu yerel düzenlemelere uygun olarak imha ediniz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Lumisena® profesyonel uygulayıcılar tarafından uygulanması gereken, akıcı süspansiyon bir tohum ilacıdır. Uygulayıcılar tohuma uygulama, depolama ve nakliye sırasında toz salınımının en aza indirilebilmesi için mümkün olan en iyi teknikleri kullanmalıdır. Toprağa iyice karışmayı, döküntü ve toz emisyonunu en aza indirmeyi sağlamak için uygun tohum ekim ekipmanı kullanılmalıdır.

İlaçlı tohumun dağıtıma çıkmadan önce renklendirilmesi gerekmektedir.
Lumisena® ayçiçeği mildiyösü hastalığına etkili olup *Pyhtium* gibi diğer tohum hastalıklarına karşı ilaçlamanın etki alanını genişletmek için diğer uygun fungisitlerle birlikte kullanılabilir. Bölgenizdeki bu hastalıkların geçmiş verilerine dayanarak öngörülen hastalık baskısı konusunda rehberlik için yerel Corteva şirket temsilcinize ya da tarım danışmanına başvurunuz.

Saha ve laboratuvar testleri Lumisena®'nın çimlenmeyi olumsuz etkilemeyeceğini göstermiştir. Tohum güvenliği için tüm ayçiçeği çeşitlerinin veya hibritlerinin tamamında test edilmemiştir. Lumisena®'nın tüm çeşitlerde veya hibritlerde ya da tüm çevresel koşullarda ve gelişim şartlarında incelenmesi mümkün olamayacağı için tohum güvenliğinin önceden test edilmesi önerilmektedir. Ürünü etikette yer alan talimatlara uygun olarak az miktarda hedef tohuma uygulayınız. Fitotoksik etkinin olmayıp uygun çimlenmenin olduğundan emin olunuz.

CORTEVA™
agriscience

Lumisena®

Tohum ilaçlaması için akıcı süspansiyon **(FS)**

Grup	F9,49	Fungisit (Mantar İlacı)

200 g/L Oxathiapiprolin

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.

Yutulması halinde; Tıbbi bakım alınız. Doktor veya toksisite merkezi tarafından söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla çalkalayınız.
Solunması halinde; Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalınırsa doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir.
Deriyle teması durumunda; Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Gözle teması halinde; Maddenin tehlikeli olması beklenmediğinden dolayı özel müdaheleler belirtilmemiştir. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

™® Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

T.C.
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı: Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Oxathiapiprolin

ZARARLILIK İFADELERİ:
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği / kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
EUH208 Alerjik reaksiyona yol açabilir.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Ürünü yalnızca kendi orijinal ve uygun etiketli ambalajında saklayınız. Ambalajları kuru, serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 3 yıl süre ile Lumisena®'nın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :
Corteva bu bitki koruma ürününün etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yeralmış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu bitki koruma ürününün kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen uygulamalardan meydana gelebilir ki bunlar Corteva'nın kontrolü dışındadır. Bu ürün ile tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal uygulama koşulları dışındaki şartlarda yapılan uygulamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Corteva hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. CORTEVA BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

CORTEVA™
agriscience
CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 210 000 0066
Tic. Sicil No: 85415

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

ÜRÜN KAYBI / MÜNAVEBE BİTKİLERİ
Ürün kaybı durumunda ekilecek ürünler için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sezon başında ürün kaybı durumunda Lumisena® ile ilaçlanmış tohumlar tekrar ekilebilir. Lumisena® ile ilaçlanmış tohumların kullanımı, sonraki münavebe bitkileri için sorun oluşturmamaktadır ve bununla ilgili özel bir kısıtlamaya gerek yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Lumisena® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup F9,49 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle olası direnç gelişimini geciktirmek için Lumisena®'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup F9, 49 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Lumisena® fungisit, insektisit, nematisit veya mikro besin elementleri dahil olmak üzere diğer ruhsatlı tohum ilaçlarıyla su bazlı bir bulamaç halinde uygulanabilir. Polimerler, renklendiriciler ve diğer katkı maddeleri, Lumisena® ile birlikte kullanılmadan önce karışabilirlik ve tohum güvenliği açısından test edilmelidir. Karışım yapmadan önce arzu edilen karışımın küçük bir miktar ön karışımı hazırlanarak, olası olumsuz değişimlerin (çökelme, topaklanma vb.) olmadığından emin olunması önerilmektedir. Karışımda kullanılan ürünlere ait etikette yer alan sınırlamalarına ve önlemlerine dikkat ediniz.Etikette yer alan dozları aşmayınız. Karışabilirlikle ilgili sınırlaması olan ilaçlarla karışım yapmayınız.

CORTEVA™ agriscience

Lumisena®

Tohum ilaçlaması için akıcı süspansiyon **(FS)**

Grup	F9, 49	Fungisit (Mantar İlacı)

200 g/L Oxathiapiprolin

ÜRETİCİ FİRMA:
Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160
CH-1290 Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:
Corteva Agriscience France S.A.S.
82, Rue de Wittelsheim
BP 90149, 68701
Cernay Cedex, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mah. Karataş Bulvarı No: 910,
01375, Yüreğir, Adana
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil Durum için: +90 538 973 22 00

CORTEVA™ agriscience
CORTEVA TURKEY TARIM A.S.
YÜREĞİR V.D. - 310 000 0066
Hc. Sicil No: 85615
Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ÖDEMİŞ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı