

ESTIMULANTE - ELICITOR

APLICACIÓN FOLIAR

ReZist

Composición

Ácido Salicílico	1% p/p
Manganeso	1,75 % p/p
Zinc	1,75 % p/p
Cobre	1,75 % p/p

Líquido

Tensión superficial: 67,2 dyna/cm

Densidad: 1,208 g/mL

pH: 9,7

Solubilidad: Soluble en agua

Inscripto en SENASA con el N° 60.773

Origen: Argentina

Contenido neto: 1, 5, 10 y 20 L

N° CUVE: 77134260

Fecha Fabricación: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

N° Lote: Ver envase



Corteve Agriscience Argentina S.R.L.

Av. Del Libertador 498, Piso 12, CABA, (C1001ABR). Buenos Aires, Argentina.

Tel: (011) 4110-0201/0202

Tel: 0810-4444-369

www.corteve.com.ar

® Marca registrada de Corteve Agriscience LLC

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en su envase original, etiquetado y bien cerrado en un lugar cubierto, ventilado, fresco y bajo llave. Mantener apartado de alimentos para humanos, forrajes, semillas y plaguicidas.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Durante la manipulación utilizar ropa adecuada, guantes y anteojos protectores.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia separando los párpados. Remover los lentes de contacto, si están presentes o sea fácil de hacerlo. Continuar con el enjuague durante 15 minutos.

En caso de contacto con la piel: Lavarse con abundante agua y jabón.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS

Los envases vacíos no pueden volver a utilizarse, tampoco enterrar ni quemar. Realizar el triple lavado e inutilizar el envase perforándolo, intentando no dañar la etiqueta. Su disposición debe realizarse según las normas locales vigentes.

“NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MÁXIMA INSOLACIÓN”.

“SE DEBERÁ UTILIZAR CONJUNTAMENTE CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL MISMO O CONJUNTAMENTE CON AGROQUÍMICOS”

GENERALIDADES

ReZist es un Elicitor cuya formulación contiene Ácido Salicílico. Éste induce la respuesta de Resistencia Sistémica Adquirida de las plantas, activando así los mecanismos de defensa natural e incrementando la resistencia al estrés biótico. Es recomendado para el uso sobre el cultivo de vid, mejorando las defensas naturales frente a enfermedades.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN

Agite el producto antes de utilizarlo. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Homogeneizar la mezcla antes de cada aplicación.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

ReZist se aplica de forma foliar, utilizando equipos terrestres o aéreos.

Aplicar un volumen de caldo entre 300-1000 L/ha según el estado del cultivo, y desarrollo foliar de las plantas.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Vid	1 a 2 L/ha	Aplicar <u>previo</u> a los estadíos fenológicos susceptibles a las enfermedades

INCOMPATIBILIDAD

ReZist es compatible con la mayoría de los agroquímicos y fertilizantes de uso regular. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados junto con **ReZist** deben estar registrados para ese uso particular.

LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA SON ORIENTATIVAS. SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL PROFESIONAL INGENIERO AGRÓNOMO RESPONSABLE.

Responsabilidad legal: Corteva Agriscience Argentina S.R.L. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en este rótulo.