



Características

Grupo de Maturação	6,1
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Acamamento	Moderadamente Resistente
Altura de Planta	90 cm
Cor do Hilo	Preto imperfeito
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hipocótilo	Púrpura
PMS Médio ¹	175 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Elevado potencial produtivo
- Superprecocidade para Macro 2
- Possibilita segunda safra
- Moderadamente resistente a *M. incognita* e *javanica*

Resposta aos principais nematoides

Nematoide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	MR
<i>Meloidogyne javanica</i>	MR
<i>Heterodera glycines</i>	S
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Evitar solos compactados e excesso de umidade
- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose			SI	
Cercosporiose			SI	
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo				
Podridão rad. de fitóftora				
Podridão cinzenta				SI

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem Informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
201	120-125	320-360	280-320	320-360	
202	118-123	320-360	280-320	320-360	
203	115-120	320-360	280-320	320-360	
204	115-120	320-360	280-320	320-360	
301	105-110	320-360	300-320	320-360	
302	105-110	320-360	300-340		
303	100-105	320-360	300-340		

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: PREFERENCIAL TOLERADO