



Características

Grupo de Maturação	6,1
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Acamamento	Moderadamente Resistente
Altura de Planta	75 cm
Cor do Hilo	Preto imperfeito
Cor da Flor	Roxa
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hipocótilo	Púrpura
PMS Médio ¹	185 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Precocidade com performance produtiva
- Possibilita segunda safra
- Engalhamento
- Amplitude de plantio
- Arranque inicial

Resposta aos principais nematoides

Nematoide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	MS
<i>Meloidogyne javanica</i>	MS
<i>Heterodera glycines</i>	S
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade
- Evitar aplicação de fungicidas com base oleosa
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose			SI	
Cercosporiose			SI	
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo				
Podridão rad. de fitóftora				
Podridão cinzenta				

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
101	135-140		240-260	240-280	240-260
102	130-135		240-260	240-280	240-260
201	125-130	260-300	240-280	260-300	
202	120-125	260-300	240-280	260-300	
203	SI	SI SI	SI SI SI	SI SI	SI SI
204	115-120	280-320	280-320	280-320	
301	110-115	280-320	280-320	280-320	

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: PREFERENCIAL TOLERADO