



Características

Grupo de Maturação	8.2
Hábito de Crescimento	Determinado
Acamamento	Resistente
Altura de Planta	70 cm
Cor do Hilo	Marrom claro
Cor da Flor	Branca
Cor da Pubescência	Cinza
Cor do Hipocótilo	Verde
PMS Médio ¹	178 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Potencial produtivo
- Porte e arquitetura
- Moderadamente tolerante à Antracnose e Mancha-alvo

Resposta aos principais nematoides

Nematoide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	MS
<i>Meloidogyne javanica</i>	S
<i>Heterodera glycines</i> (Raça 3)	R
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Indicado para áreas de abertura
- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose				
Cercosporiose				SI
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo				
Podridão rad. de fitóftora				SI
Podridão cinzenta				

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem Informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
402	118-122		280-300		

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: PREFERENCIAL TOLERADO