



Características

Grupo de Maturação	7.3
Hábito de Crescimento	Indeterminado
Acamamento	Moderadamente Resistente
Altura de Planta	80 cm
Cor do Hilo	Preto var. Marrom
Cor da Flor	Branca
Cor da Pubescência	Marrom claro
Cor do Hipocótilo	Bronze
PMS Médio ¹	145 g

¹PMS pode sofrer variações dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

✓ Pontos Fortes

- Elevado potencial produtivo
- Precocidade com estabilidade
- Resistente ao Nematóide do Cisto (raças 3 e 14)

Resposta aos principais nematoides

Nematóide	Resistência
<i>Meloidogyne incognita</i>	MS
<i>Meloidogyne javanica</i>	MS
<i>Heterodera glycines</i> (Raças 3 e 14)	R
<i>Pratylenchus brachyurus</i>	SI

Legendas: S = Suscetível / MS = Moderadamente Suscetível / MR = Moderadamente Resistente / R = Resistente / SI = Sem informação

👍 Recomendações

- Indicada para áreas de refúgio;
- Recomendada para solos de fertilidade média/alta
- Monitorar DFC para aplicação de fungicidas
- Ajustar a população conforme nível de fertilidade

Resposta às principais doenças²

Doenças	S	MS	MT	T
Antracnose				SI
Cercosporiose				SI
Cancro da Haste				
Oídio				
Mancha-alvo				
Podridão rad. de fitóftora				
Podridão cinzenta				SI

Legendas: S = Suscetível MS = Moderadamente Suscetível MT = Moderadamente Tolerante T = Tolerante SI = Sem informação

²Avaliação da reação da cultivar às principais doenças em ambientes de alta incidência e severidade.

Matriz de Posicionamento

Microrregião	Ciclo em dias	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
301	107-112	460-480	440-460	400-440	
302 MG	110-115		440-460	400-440	
303	110-115		440-460	400-440	
401	100-110	440-480		400-440	
402	100-110	440-480		400-440	

Época de plantio x número de plantas finais por hectare (x 1.000). Em solos mais férteis utilizar a menor população recomendada. O ciclo da cultivar poderá sofrer alteração dependendo das condições de clima e manejo utilizado.

Legendas: PREFERENCIAL TOLERADO