FERTILIZANTE LÍQUIDO
APLICACIÓN FOLIAR

StollerZinc®

Stoller

- La línea STOLLER® corresponde a fertilizantes líquidos indicados para aplicaciones foliares en todos los cultivos, aportando los nutrientes de forma eficiente y rápida, quedando disponibles para la planta de forma inmediata.

- Todos los nutrientes de la línea STOLLER® se encuentran quelatizados, es decir, están protegidos contra reacciones químicas, permaneciendo disponibles en las plantas hasta que sean absorbidas por las hojas, ramas y raíces. Lo anterior se debe a que los nutrientes pierden sus cargas positivas, impidiendo que ocurra incompatibilidad del nutriente y el plaguicida, teniendo una mayor y más rápida absorción por parte de la planta.

CONDICIONES DE VENTA

1.- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2.- Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Se recomienda hacer una prueba de mezcla para comprobar compatibilidad. Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:
1.- Agua 2.- STOLLER ZINC® 3.- Agroquímico

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Evitar contacto directo con el suelo y otros productos.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Avellano Europeo	0,5 L/ha	Aplicar en botón floral, repetir a los 15 días.
Maíz	0,7 - 1,5 L/ha	1 aplicación a los 30 días post-emergencia.
Arroz y Sorgo	0,7 - 1,5 L/ha	1 aplicación a los 30 días post-emergencia.
Trigo	0,5 - 1 L/ha	1 aplicación a los 30 días post-emergencia. Repetir según necesidad.
Poroto	0,5 - 1 L/ha	1 a 2 aplicaciones a partir de los 25 a 30 días post-emergencia.
Naranjos, Pomelos, Limoneros, Mandarinos	50 cc / 100 L agua	Realizar aplicaciones durante brotaciones de otoño y primavera, repitiendo en función de la necesidad.
Manzanas	50 - 75 cc / 100 L agua	3 aplicaciones al año. botón rosado, caída de pétalos y crecimiento de frutos.
Tomate, Pimentón, Hortalizas en general	50 cc/ 100 L agua	4 aplicaciones cada 7 días iniciando el tratamiento con la 1° aplicación de pesticida.
Frutales: Peral, Kiwi, Palto, Nectarino, Cerezo, Ciruelo, Duraznero,Damasco, Olivo.	50 - 75 cc / 100 L agua	Aplicar en Inicio de floración. Y según análisis foliar aplicar en conjunto con la fertilización de postcosecha.
Frutilla	0,5 L/ha	Aplicar al inicio de brotación o cuando se presenten síntomas de deficiencia.
Ajo y Cebolla	50 cc / 100 L agua	4 aplicaciones cada 7 días iniciando el tratamiento a inicios de bulbificación.
Nogales, Almendro y Pistacho	50 - 75 cc / 100 L agua	En conjunto con la fertilización de postcosecha.
Uva de Mesa y Viñas	0,5 - 1 L/ha	Aplicar en brotes de 25 a 30 cm, para promover crecimiento vegetativo.
Raps	0,3 L/ha	Realizar dos aplicaciones 1°.- elongación de tallos • 2°.- 10% de flor.
Cerezos	1 L/ha	Aplicar en fruto cuajado.
Arándanos y Frambueso	50 - 75 cc/ 100L agua	Aplicar en inicio de floración. Y según análisis foliar aplicar en conjunto con la fertilización de postcosecha.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Zinc (ZnO)	17%

Quelatado con un complejo de ácidos carboxilicos y lignosulfonatos
(Valores expresados en % peso/volumen)

pH	7,5
Densidad (g/L)	1370 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20°C

METALES PESADOS (mg/kg)

Arsénico	0,03
Plomo	3,93
Cadmio	3,71
Mercurio	0,01

ND. No detectado.
Límite establecido analítico 0,5 mg/kg

AGITESE ANTES DE USAR

Stoller
Activando el poder de las plantas

WWW.STOLLER.CL

Para consultas técnicas contactarse con el Ing. Agrónomo de Stoller en su zona o con el departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2314789
dtecnico@stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.
® Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.

BALANCE HORMONAL
NUTRICIÓN VEGETAL
EXPRESIÓN GENÉTICA