

# GALANT PLUS<sup>®</sup> 10,4 EC

HERBICIDA - ARILOXIFENOXIPROPIONICO  
HALOXYFOP-METHYL

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

**Composición química:**

	% m/v
Methyl(R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate.....	10,40
Ingredientes inertes.....	92,60
Solvente: Solvesso	

**Contiene:** 104 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

## ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,03 g/mL a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**



**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

**FORMULADOR:** Corteva Agriscience de Colombia S.A.S

A.A. 2888, Mamonal Kilómetro 14, Cartagena, Colombia. Tel.: (+57) 605 5668-8000

**REGISTRANTE:** Importadora Agrícola Rinconada S.A.

Euclides Morillo #60 Santo Domingo, República Dominicana. Tel: 809 565 5344

<sup>™</sup> <sup>®</sup> Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas.

© Corteva.

# GALANT PLUS<sup>®</sup> 10,4 EC

## USO AGRONÓMICO:

Herbicida sistémico para uso agrícola.

## MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

**GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC** es un herbicida post emergente de acción sistémica, selectivo a plantas de hoja ancha, se utiliza para el control de malezas gramíneas. Por su alta capacidad de penetración a través del follaje de las malezas, se trasloca a los puntos de crecimiento tales como yemas y rizomas asegurando un control efectivo. Detiene el crecimiento de la maleza inmediatamente después de ser aplicado, eliminando la competencia al cultivo.

## EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso, sin fugas y calibrado. Este producto es corrosivo. La distancia de aplicación en forma terrestre debe ser mayor de 50 metros de distancia de fuentes de agua, case-ríos y poblados.



## FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad el tanque de mezcla, agregue el adyuvante, agite, luego la dosis de **GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC** y termine de llenar con agua y agite. Si debe corregir el pH y dureza del agua, se debe hacer esta práctica antes de agregar el **GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC**. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.

**pH del agua:** Se recomienda el uso de agua de buena calidad especialmente con bajo grado de durezas y un pH balanceado (6.5 - 8).



## INTERVALO DE APLICACIÓN:

En frijol se aplica únicamente en los primeros estadios del cultivo.

## INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para frijol en Rep. Dominicana 30 días.

# GALANT PLUS<sup>®</sup> 10,4 EC

## RECOMENDACIONES DE USO:

País: República Dominicana

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Frijol, <i>Phaseolus vulgaris</i>	Cañamazo, <i>Paspalum fasciculatum</i>	600-800 mL/ha (420-560 mL/mz)	Realizar aplicaciones del <b>GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC</b> entre los 15 y los 30 días después de la siembra del frijol, dependiendo del grado de infestación de la maleza. Utilizar un volumen de aplicación de 200 L/ha.

## INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas o hasta que haya secado bien el caldo de aplicación.

## FITOTOXICIDAD:

Es fitotóxico a los cultivos de arroz, maíz, sorgo, caña de azúcar.

## COMPATIBILIDAD:

Es compatible con organofosforados, carbamato, piretroides. No mezcle con plaguicidas como 2,4-D, Ioxinil, Dicamba y Picloram.

**Manejo de resistencia:** **GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC** contiene el ingrediente activo Haloxypop- Methyl (GRUPO HRAC 1). No se recomienda usar únicamente **GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC** u otros herbicidas del GRUPO 1 para controlar la misma maleza durante toda la temporada. Realice una aplicación por ciclo de cultivo y asegúrese de mantener un intervalo de 7 días con la aplicación de cualquier otro herbicida. Se recomienda rotar las aplicaciones con productos que tengan diferente modo de acción (MoA). En caso de realizar mezclas de tanque, se recomienda hacerlo con productos de diferente MoA, teniendo cuidado de no generar incompatibilidades que conlleven a daños potenciales al cultivo o pérdida de eficacia. No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las malezas. Elimine de manera manual o con un herbicida de otro modo de acción cualquier maleza que haya sobrevivido a la aplicación de **GALANT<sup>®</sup> PLUS 10,4 EC** y evite que produzca semillas.

# GALANT PLUS® 10,4 EC

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS .



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

## SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Puede causar irritación en los ojos con daño a la córnea. Puede causar irritación o quemaduras en la piel. Si se ingieren pequeñas cantidades de manera incidental durante las operaciones normales de manejo es poco probable que se provoquen lesiones; sin embargo, la ingesta de cantidades mayores puede causar lesiones.

## PRIMEROS AUXILIOS

**EN CASO DE INGESTIÓN:** no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). **Para Rep. Dominicana:** suministrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** dar tratamiento sintomático.

## CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
República Dominicana	Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan)	(809) 684-3478 / 3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

# GALANT PLUS<sup>®</sup> 10,4 EC

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES  
DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

PROTEJA EL AMBIENTE CON  
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO,  
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

No bioacumula, biodegradación es baja. Confinar el material derramado si es posible, absorber con materiales tales como: arcilla, barro, arena y barrer. Se deberá recoger en recipientes apropiados y debidamente etiquetados.


RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS  
Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS  
QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS  
CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON  
BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN)  
QUE MINIMICEN LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,  
DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA  
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE  
EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	Y	NÚMERO DE REGISTRO
Rep. Dominicana		4244