



CURZATE[®] M 72 WP

FUNGICIDA – ACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**

Composición química:

	% m/m
1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea	8,00
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	64,00
Ingredientes inertes	28,00

Contiene: 720 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:
Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 N° 7 - 21 Torre A Piso 14
Teléfono: (+57) 601 259 5900
Bogotá D.C - Colombia

REGISTRANTE:
Agro Solutions, S.R.L.
Calle Miguel Ángel Garrido No 11 Ensanche, Los Prados,
Santo Domingo, República Dominicana.

™ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva

CURZATE[®] M 72 WP

**FUNGICIDA – ACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.



**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

USO AGRONÓMICO:
Fungicida de uso agrícola.

MODO Y MÉCANISMO DE ACCIÓN:

El mancozeb y cymoxanil son fungicidas con acción de contacto, protector, curativo y erradicante. Mancozeb actúa sobre la producción de energía inhibiendo la formación de enzimas y afecta la germinación de esporas, crecimiento micelial y formación de conidióforos, ocurriendo una acción "multi-sitio". El cymoxanil penetra rápidamente a través de los tejidos de la planta; por lo tanto es resistente al lavado por lluvia o riego después de 2 a 3 horas de aplicado. **Curzate[®] M 72 WP** es más efectivo contra los estadios tempranos de infección (antes de que los síntomas de la enfermedad sean visibles); asimismo, es efectivo cuando los síntomas iniciales son aparentes.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Curzate[®] M 72 WP, puede aplicarse con equipos de aspersión terrestres y aéreos. Para aplicaciones terrestres usar de 200 a 300 litros de caldo/ha de acuerdo al cultivo y edad del mismo; en las aéreas usar de 25 a 30 litros/ha.

En ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente solo con agua, utilice boquillas de cono hueco. Verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Aplique cuando el tiempo esté calmado y sin brisa. Mantenga siempre a mano el equipo auxiliar que consiste en cubetas, dosificadores, paletas, brochas, cepillos y otros que le sean de utilidad en la preparación y aplicación del producto. Este producto no es corrosivo ni inflamable.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La cantidad del agua debe ir acorde al área de aplicación o el volumen de agua para preparar la mezcla, llene el tanque hasta la mitad, manteniendo una agitación constante, vierta la cantidad de producto necesario y termine de llenar el tanque de agua, agite bien la mezcla. Cada vez que va a llenar una aspersora recuerde agitar bien la mezcla. Puede agregar un dispersante-adherente como último ingrediente de la mezcla, a la dosis recomendada por el fabricante. Esta mezcla debe ser aplicada en aspersiones foliares en los cultivos recomendados.

pH del agua: Se recomienda el uso de agua de buena calidad, especialmente con bajo grado de durezas y un pH balanceado (6.5 - 7)



CURZATE[®] M 72 WP

**FUNGICIDA – ACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB**

RECOMENDACIONES DE USO:

País: República Dominicana

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Cebolla, <i>Allium cepa</i>	Mildiu de la cebolla, <i>Peronospora destructor</i>	2 - 3 kg/ha	Utilice suficiente agua para obtener un completo cubrimiento de las plantas. Añada un agente humectante-adherente. Use como material de trasplante únicamente plantas libres de enfermedad.
Lechuga, <i>Lactuca sativa</i>	Mildiu de la lechuga, <i>Bremia lactucae</i>		
Papa, <i>Solanum tuberosum</i> Tomate, <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i>		
Melón, <i>Cucumis melo</i> Pepino, <i>Cucumis sativus</i> Sandía, <i>Citrullus lanatus</i>	Mildiu vellosa, <i>Pseudoperonospora cubensis</i>		

CURZATE[®] M 72 WP

**FUNGICIDA – ACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB**

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y repetir cada 3-5 días dependiendo de la incidencia del hongo y la humedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o en caso contrario utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: CURZATE[®] M 72 WP, no es fitotóxico a las dosis e indicaciones establecidas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: CURZATE[®] M 72 WP, es compatible con insecticidas y fungicidas de uso común en los cultivos.

Manejo de Resistencia

CURZATE[®] M 72 WP contiene el ingrediente activo Cymoxanil (GRUPO FRAC 27) y Mancozeb (GRUPO FRAC M03). No se recomienda usar únicamente CURZATE[®] M 72 WP, u otros fungicidas de los GRUPOS 27 y M03 para controlar la misma enfermedad durante toda la temporada. Se recomienda rotar y/o mezclar con productos que tengan diferentes modos de acción (MoA) o limitar el número total de aplicaciones por temporada. No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. CURZATE[®] M 72 WP no debe alternarse o ser mezclado con cualquier fungicida al que ya se haya desarrollado resistencia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:


NO ALMACENAR ES PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Tanto en el transporte como en el almacenamiento procure que no esté el producto con ningún tipo de herbicida. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco; alejado del calor. Los residuos sin usar deben guardarse en su envase original debidamente cerrado y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.



CURZATE[®] M 72 WP

**FUNGICIDA – ACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB**

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN

Se presenta enrojecimiento en los ojos y alergias en la piel, irritación de las mucosas nasales, mareos y dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). Para **República Dominicana:** suministrar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones	(809) 480 4399 (809) 985 6560
	Dr. Jesus Boadas	(809) 657 0709

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

Solubilidad en agua: dispersable. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.





CURZATE[®] M 72 WP

**FUNGICIDA – ACETAMIDA, DITIOCARBAMATO
CYMOXANIL, MANCOZEB**

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

FORMULADO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Calle 113 N° 7-21 Torre A Piso 14
Teléfono: (+57) 601 259 5900
Bogotá D.C - Colombia

REGISTRANTE:

Agro Solutions, S.R.L.
Calle Miguel Ángel Garrido No 11 Ensanche,
Los Prados, Santo Domingo, República Dominicana.

IMPORTADOR:

PAÍS	Y	NÚMERO DE REGISTRO
República Dominicana		3219