Spintor® Green

Qalcova™ active

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Spintor™ Green es el nuevo concepto en protección de granos por tratarse de una formulación única que incluye 240 g por litro de **Qalcova™ active,** una mezcla de espinosinas A y D las cuales se obtienen de la fermentación aeróbica del actinomiceto del suelo *(Saccharopolyspora spinosa).*

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva

Spintor® Green

Qalcova™ active

INSECTICIDA

Conquistamos fronteras.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: **Qalcova™ active**
Familia Química: Spinosines
Presentaciones: 1L
Categoría Toxicológica: 5 (Banda Verde)
Registro sanitario: RSCO-INAC-0101Y-0195-064-22.14

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingredientes activo: Spinosad: Spinosyn A y Spinosyn D Equivalente a 240 g de i.a./L.
Ingredientes inerte: Anticongelante, espesantes, dispersante, antiespumante, surfactante y disolvente.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Excitando el sistema nervioso por alteraciones en la función nicotínica y los canales iónicos del GABA.

RECOMENDACIONES DE USO

GRANO O SEMILLA	PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN	LMR [ppm]** Qalcova™ active
Frijol *Phaseolus vulgaris* (1) Maíz *Zea mays* (1) Sorgo* *Sorghum vulgare* (1) Trigo *Triticum* spp. (1) Arroz *Oryza sativa* (1) Cebada *Hordeum vulgare* (1) Centeno (1) Avena *Avena sativa* (1)	**Gorgojo del frijol** *(Acanthoscelides obtectus)* **Gorgojo pinto del frijol** *(Zabrotes subfasciatus)* **Gorgojo del arroz** *(Sitophilus oryzae)* **Palomilla de la harina del maíz** *(Plodia interpunctella)* **Gorgojo castaño de la harina** *(Tribolium castaneum)* **Gorgojo plano de los granos** *(Cryptolestes spp)* **Picudo del maíz** *(Sitophilus zeamais)* **Palomilla de los cereales** *(Sitotroga cerealela)* **Barrenador grande del grano** *(Prostephanus truncatus)* **Gorgojo dientes de sierra** *(Oryzaephilus surinamensis)*	**2 - 6 mL de producto/ton de grano** Preparación de la mezcla: 2 ml de producto + 298 ml de agua, para un período de protección de 6 meses. 4 - 6 ml de producto + 296 - 294 ml de agua, para un período de protección de 12 meses.	Aplicar de manera uniforme directamente a la columna de caída de grano o semilla, al momento de la descarga al silo o bodega; sincronizando el tiempo de aplicación de acuerdo con las especificaciones del dosificador neumático y a la tabla de calibración del equipo. * Por el tamaño de grano del sorgo, así como, para el caso de *Tribolium* spp., se recomienda siempre utilizar la dosis alta.	Arroz, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, trigo: 1.5 Frijol: 0.3
		***6 mL de producto/ton de grano** Preparación de la mezcla: 6 ml + 294 ml para un período de protección desde 6 y hasta 12 meses.		
	Gorgojo del grano *(Rhyzopertha dominica)* **Gorgojo falso o confuso de la harina** *(Tribolium confusum)* **Gorgojo del trigo** *(Sitophilus granarius)*	**1.5-3.0 mL de producto/ton de grano** **Preparación de la mezcla:** 1.5 ml de producto + 298.5 ml de agua, para un período de protección de 6 meses. 3.0 ml de producto + 297 ml de agua, para un período de protección de 12 meses.		

( ) IS: Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la aplicación del producto y la manipulación del grano.
Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas. Se recomienda usar la dosis máxima de 4 ml en granos que se usarán para consumo humano y/o animal.
**** La fuente de referencia del Límite Máximo de Residuos (LMR)** corresponde a lo autorizado por COFEPRIS/ EUA-EPA. Debido a que los valores de LMRs pudieran cambiar con el tiempo, se recomienda al usuario consultar las fuentes de referencia oficiales y para el caso de exportación queda bajo su responsabilidad el cumplimiento con los LMRs de los países destino.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra con cuidado la tapa para no salpicarse o inhalar el producto, gire la rosca en sentido contrario al reloj. Llene el depósito hasta la mitad de su capacidad, agréguese el producto y complete el volumen de agua. Mantenga el caldo en constante agitación. Se recomienda usar la dosis máxima de 4 ml en granos que se usarán para consumo humano y/o animal.

CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar cuando existan vientos mayores a 10 km/hr en el lugar de la aplicación del producto.

INCOMPATIBILIDAD: Spintor® Green no debe ser mezclado con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis y a los cultivos aquí recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

RED DE CUSTODIA
PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO
Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com

Registro Sanitario: RSCO-INAC-0101Y-0195-064-22.14
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5 PRECAUCIÓN
Titular del registro: CORTEVA MX, S.A. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

Fecha de actualización:: Mayo 2026

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **www.corteva.mx**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva