Spintor® Green — **INSECTICIDA**

GRANO O SEMILLA	PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN
Cebada *Hordeum vulgare* (1) Centeno (1) Avena *Avena sativa* (1)	Gorgojo del grano *(Rhyzopertha dominica)* Gorgojo falso o confuso de la harina *(Tribolium confusum)* Gorgojo del trigo *(Sitophilus granarius)*	**1.5-3.0 mL de producto/-ton de grano Preparación de la mezcla:** 1.5 ml de producto + 298.5 ml de agua, para un período de protección de 6 meses. 3.0 ml de producto + 297 ml de agua, para un período de protección de 12 meses.	Aplicar de manera uniforme directamente a la columna de caída de grano o semilla, al momento de la descarga al silo o bodega; sincronizando el tiempo de aplicación de acuerdo con las especificaciones del dosificador neumático y a la tabla de calibración del equipo. * Por el tamaño de grano del sorgo, así como, para el caso de *Tribolium spp.*, se recomienda siempre utilizar la dosis alta.

( ) IS: **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la aplicación del producto y la manipulación del grano.
Tiempo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas.
Se recomienda usar la dosis máxima de 4 ml en granos que se usarán para consumo humano y/o animal

RED DE **CUSTODIA** PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO — **Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com**

Registro Sanitario: RSCO-INAC-0101Y-0195-064-22.14
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5
Titular del registro:CORTEVA MX, S.A. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **corteva.com**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva

Spintor® Green
Qalcova™ active

INSECTICIDA

PROTEGE TUS GRANOS ALMACENADOS.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **corteva.com**

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva

Spintor™ Green es el nuevo concepto en protección de granos por tratarse de una formulación única que incluye 240 g por litro de **Qalcova™ active**, una mezcla de espinosinas A y D las cuales se obtienen de la fermentación aeróbica del actinomiceto del suelo *(Saccharopolyspora spinosa).*

BENEFICIOS

CONTROL

Amplio espectro de control, efecto de derribe en plagas de granos almacenados.

RESIDUALIDAD

Residualidad prolongada en su control

APLICACIÓN

Forma de aplicación simple, puede ser aplicado de la misma forma en que se realizan los tratamientos preventivos

Visítanos en **corteva.com**
™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva

Spintor® Green INSECTICIDA

RECOMENDACIONES DE USO

GRANO O SEMILLA	PLAGA	DOSIS	APLICACIÓN
Frijol *Phaseolus vulgaris* (1) Maíz *Zea mays* (1) Sorgo* *Sorghum vulgare* (1) Trigo *Triticum* spp. (1) Arroz *Oryza sativa* (1) Cebada *Hordeum vulgare* (1) Centeno (1) Avena *Avena sativa* (1)	**Gorgojo del frijol** *(Acanthoscelides obtectus)* **Gorgojo pinto del frijol** *(Zabrotes subfasciatus)* **Gorgojo del arroz** *(Sitophilus oryzae)* **Palomilla de la harina del maíz** *(Plodia interpunctella)* **Gorgojo castaño de la harina** *(Tribolium castaneum)* **Gorgojo plano de los granos** *(Cryptolestes* spp*)* **Picudo del maíz** *(Sitophilus zeamais)* **Palomilla de los cereales** *(Sitotroga cerealela)* **Barrenador grande del grano** *(Prostephanus truncatus)* **Gorgojo dientes de sierra** *(Oryzaephilus surinamensis)*	**2 - 6 mL de producto/- ton de grano** Preparación de la mezcla: 2 ml de producto + 298 ml de agua, para un período de protección de 6 meses. 4 - 6 ml de producto + 296 - 294 ml de agua, para un período de protección de 12 meses. ***6 mL de producto/ton de grano** **Preparación de la mezcla:** 6 ml + 294 ml para un período de protección desde 6 y hasta 12 meses.	Aplicar de manera uniforme directamente a la columna de caída de grano o semilla, al momento de la descarga al silo o bodega; sincronizando el tiempo de aplicación de acuerdo con las especificaciones del dosificador neumático y a la tabla de calibración del equipo. * Por el tamaño de grano del sorgo, así como, para el caso de *Tribolium* spp., se recomienda siempre utilizar la dosis alta.

CORTEVA™ agriscience

Visítanos en **corteva.com**
™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2026 Corteva